PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DU
MONT
VENTOUX

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ REMARQUABLE

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-VENTOUX

Parc naturel régional du Mont-Ventoux
Pargue dóu Ventour

www.parcduventoux.fr

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ REMARQUABLE

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT-VENTOUX

Une réalisation du Parc naturel régional du Mont-Ventoux

Coordination : Ken REYNA, Anthony ROUX, Noémie LASSAUGE

Rédacteurs des fiches-espèces de l'Observatoire *(par ordre d'apparition)* : Virgile NOBLE (CBNMed), Olivier HAMEAU (LPO), Jeremy RASTOUIL (LPO), Alexis RENAUX (LPO), Mathieu DAVAL (GCP), Fanny ALBALAT (GCP), Jeanne MAGNAN (PNR Mont-Ventoux), Alexandre LANGLAIS (Auddicé Environnement), Florine PALDACCI (Auddicé Environnement), Eric FIEVET (ECO-MED)

Relecteurs : Ken REYNA, Anthony ROUX, Noémie LASSAUGE

Cartographies : Noémie LASSAUGE

Photographies *(par ordre d'apparition)* : Noémie LASSAUGE, Jean-Claude ARNOUX, Anthony ROUX, Virgile NOBLE, Bernadette HUYNH-TAN, Martin STEENHAUT, Andrej CHUDY, Aurélien AUDEVARD, Hal TRACHTENBERG, Imran SHAH, Laurent ROUSCHMEYER, Adrien CHATEIGNIER, Raphaël SANÉ, Caroline LEGG, Pierre RIGAUX, Dee DUNNOCK, Lenny VIDAL, Andrès CAMPILLO CASTEJON, Tero LAAKSO, Henri QUATRE, Luciano de CASTRO, Jean-Michel BOMPAR, Benoît MORAZE, Alexandre ROUX, Cédric ALONSO, Françoise GASNIER, Jean-Pierre MOUSSU, Marie-Thérèse ZIANO, Gilles SAN MARTIN, Aurélien SALESSE, Patrick AGUILAR, Laurent MADELON, Océane ROQUINARC'H, Denis PORACCHIA, Philippe BAFFIE, Yannick LEDORÉ

Création graphique : Agence Autrement Dit

Référence bibliographique à utiliser : Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Atlas de la Biodiversité Remarquable. Carpentras : 2022, 133 p.

Nom et adresse imprimeurs :
Imprimerie RIMBAUD
888 Route d'Avignon
84300 Cavaillon

REMERCIEMENTS

MERCI...

Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux souhaite remercier vivement l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage :

L'Escolo dóu Ventour et Guilhem VATON pour les traductions provençales

L'ensemble des photographes qui ont partagé leur(s) cliché(s)

L'ensemble des coordinateurs départementaux chargés de recueillir les données et de les mettre en forme

Tous les contributeurs naturalistes qui ont apporté leur(s) observation(s) dans les bases de données au fil des années et ont donc considérablement enrichi les connaissances de la présence des espèces du territoire

Les partenaires rédacteurs des fiches-espèces qui ont inspiré ce livre :

- Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles, pour les fiches Flore
- La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, pour les fiches Avifaune
- Le Groupe Chiroptères de Provence, pour les fiches Chiroptères
- Le bureau d'études ECO-MED, Ecologie et Médiation, pour les fiches Faune aquatique
- Le bureau d'études et de conseil Auddicé Environnement, pour les fiches Entomofaune

Le personnel du Parc qui a coordonné et piloté l'élaboration de cet ouvrage :

- Ken REYNA, directeur
- Anthony ROUX, responsable du Pôle Nature, Patrimoines, Education et chargé de mission Biodiversité et espaces naturels
- Noémie LASSAUGE, chargée de projet Atlas de la Biodiversité Communale
- Maud LAURENT et Jeanne MAGNAN, volontaires en Service civique

Les financeurs :

- La Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur
- L'Office Français de la Biodiversité via le Plan France-Relance

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS 1
EDITO 4
PRÉAMBULE 5
LÉGENDE 6

LA FLORE 8

Alysson penché 10
Ancolie de Reuter 11
Bassie à fleurs laineuses 12
Berce naine 13
Chou allongé à feuilles entières 14
Corbeille d'Argent de De Candolle 15
Corisperme de France 16
Elatine fausse alsine 17
Euphorbe à feuille de graminée 18
Euphorbe de Loiseleur 19
Fritillaire du Dauphiné 20
Gagée des champs 21
Gagée des prés 22
Garidelle fausse nigelle 23
Genêt de Villars 24
Gesse de Pannonie 25
Lis martagon 26
Nivéole de Fabre 27
Ophrys de Sarato 28
Orchis de Provence 29
Sainfoin bas d'Europe 30
Silène de Pétrarque 31
Silène de Porto 32
Tulipe sauvage 33

L'AVIFAUNE 34

Aigle royal 36
Alouette lulu 37
Bruant ortolan 38
Busard cendré 39
Chevêche d'Athéna 40
Chouette de Tengmalm 41
Circaète Jean-le-Blanc 42
Fauvette orphée 43
Grand-duc d'Europe 44
Guêpier d'Europe 45
Hirondelle de rochers 46
Huppe fasciée 47
Merle à plastron 48
Monticole bleu 49
Œdicnème criard 50
Outarde canepetière 51
Pic noir 52
Pie-grièche à tête rousse 53
Pie-grièche écorcheur 54
Pie-grièche méridionale 55
Rollier d'Europe 56
Traquet motteux 57
Vautour percnoptère 58
Venturon montagnard 59

LES MAMMIFÈRES 60

Barbastelle d'Europe 62
Blaireau européen 63
Campagnol amphibie 64
Castor d'Eurasie 65
Cerf élaphe 66
Chamois 67
Chevreuil 68
Genette commune 69
Hérisson d'Europe 70
Lapin de garenne 71
Loup gris 72
Minioptère de Schreibers 73
Molosse de Cestoni 74
Mouflon de Corse 75
Murin à oreilles échancrées 76
Murin de Daubenton 77
Noctule de Leisler 78
Oreillard gris 79
Petit murin 80
Petit rhinolophe 81
Pipistrelle commune 82
Renard roux 83

L'ENTOMOFAUNE 84

Agrion de Mercure 86
Alexanor 87
Apollon 88
Azuré de la Croisette 89
Azuré du Serpolet 90
Carabe doré du Ventoux 91
Damier de la Succise 92
Empuse commune 93
Grand capricorne 94
Hermite 95
Lucane cerf-volant 96
Magicienne dentelée 97
Miramelle du Ventoux 98
Proserpine 99
Rosalie des Alpes 100
Zygène cendrée 101

LES AMPHIBIENS 102

Alyte accoucheur 104
Crapaud calamite 105
Crapaud épineux 106
Pélobate cultripède 107
Pélodyte ponctué 108
Rainette méridionale 109
Salamandre tachetée 110
Triton palmé 111

LES REPTILES 112

Couleuvre de Montpellier 114
Couleuvre vipérine 115
Lézard ocellé 116
Psammodromme d'Edwards 117
Seps strié 118
Vipère d'Orsini 119

LA FAUNE AQUATIQUE 120

Anguille européenne 122
Barbeau fluviatile 123
Barbeau méridional 124
Blageon 125
Chabot commun 126
Ecrevisse à pattes blanches 127
Toxostome 128
Truite commune 129

BIBLIOGRAPHIE 130
GLOSSAIRE & SIGLES 132

EDITO

Jacqueline BOUYAC

Présidente du Parc naturel régional du Mont-Ventoux

Vice-présidente de la région Provence Alpes Côte-d'Azur

Un espace béni des dieux, avec 50% d'espaces boisés, 1 000 kilomètres de côte, ses 9 Parcs naturels régionaux, 4 Parcs nationaux, 17 Réserves naturelles :

La Région Sud est riche d'un patrimoine naturel inestimable et abrite une exceptionnelle diversité floristique, avec 3 400 espèces recensées, dont 31 visibles nulle part ailleurs dans le monde. La faune n'est pas en reste, avec 85 % des espèces d'oiseaux nicheurs, entre autres. Pour réaliser l'inventaire de la biodiversité propre au Ventoux, vous avez accompli un travail considérable. Grâce à cet Atlas, nous sommes capables de mettre en place des actions concrètes pour protéger et restaurer les milieux naturels et la biodiversité du Parc. Des données qui valent de l'or pour mieux connaître, et donc, mieux protéger, notre biodiversité et mener à bien notre rôle de pilote de la transition écologique en France.

Le Mont-Ventoux est bien plus qu'une simple montagne. C'est un véritable trésor de biodiversité, abritant des écosystèmes uniques et une multitude d'espèces animales et végétales rares et fragiles.

Il est de notre devoir de veiller à la préservation de cet héritage naturel précieux pour les générations futures.

C'est pourquoi nous avons développé l'Atlas de la Biodiversité Remarquable du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, ouvrage qui permet de mettre en lumière la richesse écologique exceptionnelle de notre beau territoire. Plus de 100 espèces y sont décrites et cartographiées, constituant ainsi un état zéro des connaissances biologiques. Il représente ainsi une ressource inestimable pour les scientifiques, les chercheurs, les décideurs et tous ceux qui s'intéressent à la protection de la biodiversité. Utilisons cet outil pour sensibiliser, éduquer et inspirer les générations présentes et futures à protéger notre patrimoine naturel unique !

Renaud MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Président délégué de Régions de France

PRÉAMBULE

Du fait de son dénivelé et sa situation géographique intermédiaire entre le monde tempéré et méditerranéen, le Mont-Ventoux présente une étonnante diversité de milieux naturels et d'espèces animales et végétales. Ce véritable concentré de biodiversité des Alpes à la Méditerranée constitue un patrimoine unique à l'échelle régionale et nationale qui a largement contribué à l'obtention du label "Réserve de Biosphère" par l'UNESCO en 1990 et à la création du Parc naturel régional du Mont-Ventoux en 2020. Ce dernier s'étend sur 37 communes autour du Géant de Provence, représentant près de 88 000 hectares.

Lors de l'élaboration de la Charte du Parc, la volonté de mieux préserver la richesse écologique du territoire est apparue comme étant l'une des priorités majeures des personnes participant à la concertation. L'amélioration des connaissances naturalistes est alors primordiale.

Toutefois, la collecte des données de terrain (inventaires, études et suivis) se concentre majoritairement dans les milieux naturels "emblématiques", et leur traitement demeure hétérogène et inégal (qualitativement et quantitativement). Les connaissances disponibles ne permettent pas toujours d'apprécier les tendances d'évolution et certains groupes d'espèces ou d'habitats demeurent méconnus car sous prospectés. L'accès à la connaissance est souvent difficile car diffuse.

Il est donc apparu nécessaire de se doter d'outils d'observations à long terme, standardisés pour juger de l'évolution de la biodiversité et de la pertinence des actions de protection et de gestion à mener à l'échelle du territoire. Ces différents points constituent les fondements d'un Observatoire de la Biodiversité du Mont-Ventoux. Des fiches-espèces ont ainsi été élaborées comme documents de synthèse et constituent la base même de cet ouvrage.

Pour ces mêmes raisons, le Parc du Mont-Ventoux a initié l'élaboration d'Atlas de la Biodiversité Communale dans plusieurs communes. Ces ABC permettent de répondre à plusieurs objectifs :

- Améliorer les connaissances de la biodiversité du territoire et identifier les enjeux spécifiques liés
- Structurer l'information naturaliste à travers un outil de collecte et de mise à disposition des données
- Mobiliser les citoyens dans la prise en compte de la biodiversité et sensibiliser tous les publics (habitants, visiteurs, scolaires, acteurs socio-économiques)
- Sensibiliser les élus et renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement et les documents d'urbanisme

L'Atlas de la Biodiversité Remarquable du Parc naturel régional du Mont-Ventoux a été pensé, conçu et imprimé dans le cadre de ces ABC, afin de disposer d'une base de réflexion solide et de bénéficier d'une vision objective de l'état de santé et de l'évolution du territoire.

COMMENT LIRE LES FICHES ESPÈCE ?

PICTOGRAMMES :

Vue d'ensemble (FLORE) : description générale de l'espèce

Oiseau · Chauve-souris · Poisson · Amphibien

Mammifère · Reptile · Insecte · Flore

Principales caractéristiques physiques de l'espèce permettant son identification

Habitat : milieu naturel ou artificiel dans lequel l'espèce vit et s'épanouit

Régime alimentaire

Localisation de l'espèce dans le Parc naturel régional du Mont-Ventoux

Facteur de régression : menace(s) potentielle(s) pouvant affecter le bon maintien et la survie des populations

Phénologie : évènements périodiques propres au développement de l'espèce

Les cartes de répartition présentent les observations connues en 2022 de chaque espèce cible au sein du Parc du Mont-Ventoux. Elles sont issues des bases de données naturalistes régionales SILENE PACA et FAUNE PACA, ainsi que des structures suivantes : CEN PACA, LPO PACA, OFB, MNHN, GCP, ONF, Fédérations de pêche du Vaucluse et de la Drôme, et PNRMV. Elles ne peuvent viser l'exhaustivité.

Sources du fond cartographique : BD ALTI®75 m - BD CARTHAGE®©IGN - OCSOL-CRIGE PACA 2006.

STATUTS DE CONSERVATION :

S'appuyant sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces, **la Liste rouge des espèces menacées mise en place par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)** est reconnue comme l'outil de référence le plus fiable concernant l'état de conservation des espèces végétales et animales. Elle est composée des niveaux suivant :

- **CR** En danger critique d'extinction
- **EN** En danger
- **VU** Vulnérable
- **NT** Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
- **LC** Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
- **DD** Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
- **NA** Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale
- **NE** Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Source : Liste rouge de l'UICN

3 échelles figurent ici : Européenne, Française et Régionale (Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur).

LÉGENDE

STATUTS DE PROTECTION :

Certaines espèces bénéficient d'une protection légale au niveau international, national ou régional. La plupart des statuts font références à des listes d'espèces protégées inscrites en annexes des textes législatifs ou engagements internationaux.

DO : Directive européenne Oiseaux

Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen

Annexe I	Espèces dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe II	Espèces dont la chasse est autorisée à condition que cela ne porte pas atteinte à leur conservation
Annexe III	Espèces dont le commerce est autorisé à condition qu'elles aient été licitement tuées ou capturées

DHFF : Directive européenne Habitats-Faune-Flore

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages d'intérêt communautaire

IC prio	Intérêt communautaire prioritaire, forte responsabilité de l'Europe pour la conservation mondiale de l'espèce
Annexe II	Espèces dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
Annexe IV	Espèces qui nécessitent une protection stricte
Annexe V	Espèces dont le prélèvements dans la nature et l'exploitation peuvent faire l'objet de mesures de gestion

CBe, CBo, CW : Conventions internationales

CBe : Convention de Berne (1979), concernant la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, avec pour objectif de protéger les espèces et leurs habitats en encourageant la coopération entre Etats

Annexe I	Espèces végétales strictement protégées
Annexe II	Espèces animales strictement protégées
Annexe III	Espèces dont l'exploitation est réglementée (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, transport, vente...)

CBo : Convention de Bonn (1979), relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, sur l'ensemble de leur aire de répartition

Annexe I	Espèces menacées en danger d'extinction
Annexe II	Espèces dont l'état de conservation est défavorable

CW : Convention de Washington ou CITES (1973), relative au commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, avec pour objectif de contrôler et réglementer les échanges commerciaux

PN : Espèces protégées au niveau national

Flore	Arrêté du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national
Avifaune	Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Mammifères	Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Entomofaune	Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Herpétofaune	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection
Ecrevisses	Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 18 janvier 2000, relatif à la protection des écrevisses autochtones
Poissons	Arrêté du 08 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national

PR : Espèces protégées au niveau régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

Flore	Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

ASR : Autres Statuts Régionaux

DZNIEFF / RZNIEF	Déterminante / Remarquable Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique
DTVB / RTVB	Déterminante / Remarquable Trame Verte & Bleue
SCAP	Stratégie de Création d'Aires Protégées
PNA / PRA	Plan National d'Action / Plan Régional d'Action

Sources : LégiFrance, INPN, UICN

LA FLORE

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Alysson penché

Gourbèio d'or de Ventour

Alyssum flexicaule | **Famille :** Brassicacés
Syn. : *A. cuneifolium* auct.

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante vivace prostrée

Fleur jaune à 4 pétales / Tige et feuille d'un vert blanchâtre couvertes de poils étoilés

Milieu rocailleux du sommet du Mont-Ventoux / Pelouse sèche et éboulis calcaires

Espèce endémique du Mont-Ventoux

Isolement des populations / Fragilité des milieux / Piétinement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
VU

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Ancolie de Reuter

Galantino de Reuter

Aquilegia reuteri | **Famille :** Ranunculacés
Syn. : *A. bertolonii* auct.

Crédit photo © A. ROUX

Plante vivace dressée

Grande fleur d'un bleu vif / Feuille basale à plusieurs segments lobés

Milieu rocailleux de moyenne montagne

Espèce endémique des Alpes sud-occidentales

Travaux d'aménagements / Surfréquentation / Surpâturage

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & 4 (sous *A. bertolonii*)
CBe : An1 (sous *A. bertolonii*)
CW : -
PN : Oui
PR : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Bassie à fleurs laineuses

Bassìo lanudo

Bassia laniflora | **Famille :** Amaranthacés
Syn. : *Kochia laniflora*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante annuelle dressée

Fleur minuscules /
Tige et feuille couvertes de poils

Sable vif de la plaine comtadine
à l'étage mésoméditerranéen

Espèce eurasiatique

Fragilité des milieux / Concurrence végétale /
Mitage de l'espace

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

NE
VU
VU

STATUTS DE CONSERVATION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui

PR : Oui
ASR : DZNIEFF

STATUTS DE PROTECTION

CARTE DE RÉPARTITION



Berce naine

Plaucho naneto

Heracleum pumilum | **Famille :** Apiacés
Syn. : *H. minimum*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante vivace basse

Fleur blanche en ombelles peu fournies /
Feuille divisée à lobe large

Éboulis calcaires en versant nord

Espèce endémique
des Alpes sud-occidentales

Pas de menace particulière
sur les populations du Ventoux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

NE
LC
NT

STATUTS DE CONSERVATION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui

PR : -
ASR : DZNIEFF

STATUTS DE PROTECTION

CARTE DE RÉPARTITION



Chou allongé à feuilles entières

Caulet afiela

Brassica elongata subsp. *integrifolia* I
Famille : Brassicacés
Syn. : *Guenthera elongata* subsp. *integrifolia*

Plante vivace un peu ligneuse

Fleur jaune clair /
Feuille peu découpée

Pelouse écorchée /
Affleurement rocheux sur gypse

Espèce eurasiatique

Dégradation et modification du biotope

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

DD
CR
CR

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : -
ASR : DZNIEFF

STATUTS DE CONSERVATION

STATUTS DE PROTECTION

CARTE DE RÉPARTITION



Corbeille d'Argent de De Candolle

Ègo naneto

Iberis nana I **Famille :** Brassicacés
Syn. : *I. candolleana* ; *I. prutti* subsp. *candolleana*

Plante naine dépassant à peine des éboulis

Fleur rose en ombelles denses /
Feuille charnue et obtuse

Eboulis calcaires mobiles /
Pelouse sèche

Espèce endémique
des Alpes sud-occidentales

Modification du biotope / Isolement des populations / Piétinement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

Crédit photo © A. ROUX

NE
LC
NT

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : DZNIEFF

STATUTS DE CONSERVATION

STATUTS DE PROTECTION

CARTE DE RÉPARTITION



Corisperme de France

Corisperme de Franço

Corispermum gallicum | **Famille :** Amaranthacés
Syn. : *C. leptopterum* auct.

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

- Plante annuelle très ramifiée
- Fleur minuscule / Tige et feuille rougissantes à la fructification
- Sable vif de la plaine comtadine à l'étage mésoméditerranéen
- Espèce endémique du bassin du Rhône et de la Durance
- Fermeture des milieux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
VU

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : Oui (sous *C. leptopterum*)-
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Elatine fausse alsine

Elatine faus mourihoun

Elatine alsinastrum | **Famille :** Elatinacés
Syn. : -

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

- Plante vivace ou annuelle semi-aquatique
- Fleur blanche minuscule / Feuille verticillée
- Mare temporaire
- Espèce des zones tempérées d'Eurasie et d'Afrique du nord
- Assèchement ou comblement du biotope

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NT
NT
CR

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : -
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Euphorbe à feuille de graminée

Lachusclo à fueio de gramenun

Euphorbia graminifolia | **Famille :** Euphorbiacés
Syn. : *E. tenuifolia*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante vivace herbacée

Inflorescence vert-jaunâtre / Feuille linéaire

Pelouse ouverte sur terrain argilo-marneux

Espèce endémique de la Provence et du Dauphiné

Fauchage, débroussaillage

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Euphorbe de Loiseleur

Lachusclo de Loiseleur

Euphorbia seguieriana subsp. *loiseleuri* |
Famille : Euphorbiacés
Syn. : *E. loiseleurii ; E. seguieriana* subsp. *loiseleurii*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante naine formant des touffes denses

Fleur verdâtre sans pétales / Feuille courte et étroite

Partie sommitale du Mont-Ventoux / Pelouse sèche et éboulis calcaires

Espèce endémique du Mont-Ventoux

Pas de menace particulière sur les populations du Ventoux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
VU

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : Oui
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Fritillaire du Dauphiné

Tulipeto en troumpeto

Fritillaria tubiformis | **Famille :** Liliacés
Syn. : *F. delphinensis* ; *F. meleagris* subsp. *delphinensis*

Crédit photo © V.NOBLE

Plante vivace bulbeuse

Fleur solitaire pendante, rouge violacé / Feuille lancéolée et dressée

Pelouse alpine, mésophile ou supraméditeranéenne jusqu'à 2 000 m

Espèce endémique des Alpes

Fermeture des milieux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Gagée des champs

Estello jauno pelouso

Gagea villosa | **Famille :** Liliacés
Syn. : *G. arvensis*

Crédit photo © C. ARNOUX

Plante vivace bulbeuse

Fleur jaune vif / Feuille velue

Agrosystème extensif des plaines et massifs

Espèce eurasiatique

Pesticides / Agriculture intensive / Anthropisation

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : RZNIEFF / Messicole

CARTE DE RÉPARTITION



Gagée des prés

Estello jauno de prat

Gagea pratensis | **Famille :** Liliacés
Syn. : *G. stenopetala*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

- Plante vivace bulbeuse
- Fleur jaune vif / Feuille d'un vert bleuâtre
- Pelouse rase pâturée / Bordure des prairies / Lisière des chênaies blanches
- Espèce euryméditerranéenne
- Surpatûrage / Fermeture des milieux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Garidelle fausse nigelle

Garidello

Nigella nigellastrum | **Famille :** Ranunculacés
Syn. : *Garidella nigellastrum*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

- Plante annuelle filiforme
- Fleur minuscule / Feuille linéaire
- Agrosystème extensif sous climat sec
- Espèce méditerranéo-touranienne
- Modification du biotope et des pratiques agricoles

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
EN
EN

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : Messicole

CARTE DE RÉPARTITION



Genêt de Villars

Genèsto de Villars

Genista pulchella | **Famille :** Fabacés
Syn. : *G. villarsii* ; incl. *G. pulchella* subsp. *villarsiana*

Crédit photo © A. ROUX

Plante vivace rampante

Fleur jaune vif /
Rameau côtelé et feuille velue

Pelouse sèche et dalle rocheuse en situation ventée

Espèce sud-européenne

Fermeture des milieux / Surfréquentation

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -

PR : -
ASR : -

STATUTS DE PROTECTION

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
LC

CARTE DE RÉPARTITION



Gesse de Pannonie

Jaisso d'Oungrìo

Lathyrus pannonicus | **Famille :** Fabacés
Syn. : -

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante vivace dressée

Fleur blanche /
Feuille divisée en foliole allongée

Prairie semi-naturelle de fauche

Espèce eurosibérienne

Modification du biotope et des pratiques agricoles

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -

PR : -
ASR : DZNIEFF

STATUTS DE PROTECTION

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NT
NT

CARTE DE RÉPARTITION



Lis martagon

Martagoun

Lilium martagon | **Famille :** Liliacés
Syn. : -

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante vivace bulbeuse

Fleur pendante rose violacée /
Feuille par 5-8 autour de la tige

Bois frais des massifs montagneux

Espèce eurasiatique

Exploitation forestière / Ouverture des milieux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui

PR : -
ASR : Cueillette réglementée

CARTE DE RÉPARTITION



Nivéole de Fabre

Neveirolo de Fabre

Acis fabrei | **Famille :** Amaryllidacés
Syn. : *Leucojum fabrei*

Crédit photo ©N. LASSAUGE

Plante vivace bulbeuse

Fleur blanche penchée vers le sol /
Feuille fine plus longue que les tiges

Affleurement rocheux calcaire / Pelouse rocailleuse
sur calcaire à l'étage supraméditerranéen

Espèce endémique du Mont-Ventoux
et des Monts de Vaucluse

Travaux d'entretiens des bords de routes ou sylvicoles /
Fermeture des milieux / Surpatûrage

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
VU

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui

PR : Oui
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Ophrys de Sarato

Aragno de Sarato

Ophrys saratoi | **Famille :** Orchidacés
Syn. : *O. bertolonii* subsp. *saratoi* ; incl. *O. drumana*

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Plante vivace à tubercule

Labelle montrant une large macule brillante / Pétale et sépale roses / Feuille linéaire

Pelouse sèche sur substrat calcaire

Espèce endémique des Alpes sud-occidentales

Destruction du biotope / Évolution naturelle de la végétation

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

DHFF : -
CBe : -
CW : An2
PN : Oui (*O. bertolonii*)
PR : -
ASR : -

STATUTS DE PROTECTION

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
LC

CARTE DE RÉPARTITION



Orchis de Provence

Gau de Prouvènço

Orchis provincialis | **Famille :** Orchidacés
Syn. : -

Crédit photo ©B. HUYNH-TAN

Plante vivace bulbeuse

Fleur jaune pâle / Feuille tachetée de violet

Lisière et clairière des chênaies blanches à l'étage supraméditerranéen

Espèce euryméditerranéenne

Pas de menace particulière sur les populations du Ventoux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

DHFF : -
CBe : An1
CW : An2
PN : Oui
PR : -
ASR : RZNIEFF

STATUTS DE PROTECTION

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

CARTE DE RÉPARTITION



Sainfoin bas d'Europe

Esparset d'Europo

Hedysarum boveanum subsp. *europaeum*
Famille : Fabacés
Syn. : -

Plante vivace couverte de poils appliqués

Fleur rose vif /
Feuille divisée en foliole

Pelouse écorchée sur des marnes érodées
en climat méditerranéen

Espèce ouest-méditerranéenne

Travaux d'aménagement / Fermeture des milieux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NT
VU

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : Oui
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Silène de Pétrarque

Empeganto de Pétrarco

Silene petrarchae | **Famille :** Caryophyllacés
Syn. : *S. vallesia* subsp. *graminea* auct.

Plante vivace plutôt couchée

Grande fleur blanc-rosé ou jaunâtre /
Feuille opposée

Affleurement rocheux /
Pelouse rocailleuse d'altitude sur calcaire

Espèce endémique des Préalpes provençales

Fermeture des milieux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de floraison

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
VU

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : -
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Silène de Porto

Empeganto di port

Silene portensis | **Famille :** Caryophyllacés
Syn. : -

Plante annuelle dressée et visqueuse aux entre-nœuds

Fleur rose clair / Feuille très étroite

Sable vif de la plaine comtadine à l'étage mésoméditerranéen

Espèce méditerranéo-atlantique

Modification du biotope

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : -
PR : Oui
ASR : DZNIEFF

STATUTS DE PROTECTION

NE
LC
VU

STATUTS DE CONSERVATION

CARTE DE RÉPARTITION



Tulipe sauvage

Tulipan

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris | **Famille :** Liliacés
Syn. : -

Plante vivace bulbeuse

Belle fleur jaune d'or / Feuille d'un vert légèrement bleuâtre

Agrosystème traditionnel

Espèce archéophyte d'origine méditerranéenne

Modification du biotope et des pratiques agricoles / Pesticides

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de floraison

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

DHFF : -
CBe : -
CW : -
PN : Oui
PR : -
ASR : RZNIEFF / Messicole

STATUTS DE PROTECTION

NE
LC
NT

STATUTS DE CONSERVATION

CARTE DE RÉPARTITION



L'AVIFAUNE

Crédit photo © M. STEENHAUT

Aigle royal

Aiglo negro

Aquila chrysaetos | **Famille :** Accipitridés
Ordre : Falconiformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

Envergure max : 230 cm / Bec crochu / Plumage marron foncé à nuances roussâtres / Blanc sur le dessous des ailes (immature)

Principalement rupestre / Utilise des falaises isolées

Eclectique : des petits passereaux aux rongeurs

Holarctique, sédentaire et nicheuse

Urbanisation / Activités sportives / Fermeture des milieux / Lignes électriques

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
VU
VU

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1 **CW :** An2
CBe : An2 **PN :** Oui
CBo : An2 **ASR :** RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Alouette lulu

Bedouïdo sauto roucas

Lullula arborea | **Famille :** Alaudidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©A. CHUDY CC BY 2.0

15 cm, envergure 20 / Plumage brunâtre / Bec fin brun / Sourcil très clair

Zone de colline et de moyenne montagne / Versants bien exposés et protégés des vents

Insectes / Graines et semences en hiver

Paléarctique, sédentaire et nicheuse

Urbanisation / Disparition des haies / Pesticides / Fermeture des milieux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1 **CW :** -
CBe : An3 **PN :** Oui
CBo : - **ASR :** DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Bruant ortolan

Chi ourtoulan

Emberiza hortulana | **Famille :** Emberizidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©A. AUDEVARD

17 cm, envergure 24-27 / Dessus des plumes brun rayé / Tête, nuque et poitrine vert en été chez le mâle

Milieu agricole avec grands arbres isolés utilisés comme postes de chant

Chenilles et insectes / Graines en complément

Paléarctique occidentale, migratrice

Disparition des haies / Pesticides / Fermeture des milieux / Braconnage

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
EN
EN

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Busard cendré

Tartau perdigaire

Circus pygargus | **Famille :** Accipitridés
Ordre : Accipitriformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

45 cm, envergure 95-115 / Plumage à dominante gris cendré chez le mâle adulte et brunâtre chez la femelle

Plaine et colline / Grande variété de milieux ouverts

Petits rongeurs / Occasionnellement insectes, amphibiens, reptiles et passereaux

Européenne, migratrice transsaharienne

Activités agricoles / Fauches / Disponibilité des ressources / Fermeture des milieux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
CR

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An3
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Chevêche d'Athéna

Machoto clapièro

Athene noctua | **Famille :** Strigidés
Ordre : Strigiformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

22 cm / Queue courte / Plumage brunâtre à taches blanches et rayures brunes serrées dessous / Yeux jaunes

Milieu agricole avec cavités pour nicher

Généraliste carnivore

Eurasiatique, sédentaire et nicheuse

Destruction des habitats / Urbanisation / Disponibilité des sites de nidification / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : An2
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Chouette de Tengmalm

Nichoulo testoulasso

Aegolius funereus | **Famille :** Strigidés
Ordre : Strigiformes

Crédit photo ©H. TRACHTENBERG CC BY-NC 2.0

25 cm, envergure 55 / Large tête / Front perlé de taches blanches / Yeux jaunes à la pupille noire

Milieu montagnard de 500 à 1 500 m d'altitude / Forêt de résineux / Hêtraie-sapinière

Micromammifères / Occasionnellement oiseaux

Hémisphère nord, sédentaire

Exploitation forestière / Rajeunissement et homogénéisation des peuplements

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
VU

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : -
CW : An2
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Circaète Jean-le-Blanc

Aiglo blanco testoulasso

Circaetus gallicus | **Famille :** Accipitridés
Ordre : Falconiformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

Envergure 180 cm / Grosse tête brune / Grands yeux jaunes / Manteau brun et ventre blanc à taches brunes

Niche en forêt /
Espace dégagé pour terrain de chasse

Se nourrit presque exclusivement de reptiles, principalement des serpents qui représentent 70 à 96% des proies

Zones tempérées chaudes, migratrice

Fermeture des milieux / Intensification agricole / Destruction des haies / Pesticides / Exploitation forestière

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Ponte et incubation, élevage des jeunes
Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : An2
CW : An2
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Fauvette orphée

Bouscarlo passerièro

Sylvia hortensis | **Famille :** Sylviidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©A. AUDEVARD

15 cm, envergure 21 / Plumage uniforme / Calotte gris foncé (mâle) ou claire (femelle) / Iris jaune (mâle)

Milieu arboré ouvert et buissonneux /
Versants secs et bien ensoleillés

Insectivore /
Baies et fruits rouges

Eurasiatique, migratrice transaharienne

Fermeture des milieux / Extension de zones cultivées

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Ponte et incubation, élevage des jeunes
Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Grand-duc d'Europe

Gros Dùgou barbajan

Bubo bubo | **Famille :** Strigidés
Ordre : Strigiformes

Crédit photo © I. SHAH CC BY-SA 2.0

75 cm, envergure 160-188 / Disque facial jaunâtre / 2 aigrettes noires / Plumage poitrine et ventre jaune-roux

Essentiellement en zone rupestre

Super prédateur / Consomme toutes les proies qu'il peut maîtriser / En France 80% des proies sont des mammifères

Eurasiatique, sédentaire

Lignes électriques / Activités sportives / Défrichement / Diminution des proies

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC (Europe)
LC (France)
LC (Catalogne)

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : -
CW : An2
PN : Oui
ASR : RZNIEFF / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Guêpier d'Europe

Abiholo verdo

Merops apiaster | **Famille :** Méropidés
Ordre : Coraciiformes

Crédit photo ©A. AUDEVARD

28 cm, envergure 44-49 / Plumage très coloré / Ventre bleu et gorge jaune chez l'adulte / Bec noir

Milieu ouvert / Près de l'eau

Hyménoptères / Occasionnellement autres insectes volants

Méditerranéenne érémienne, migratrice transsaharienne

Exploitation des carrières / Érosion naturelle / Destruction volontaire / Pesticides / Dérangement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC (Europe)
LC (France)
LC (Catalogne)

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Hirondelle de rochers

Androuleto de roco

Ptyonoprogne rupestris | **Famille :** Hirundinidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©JA. AUDEVARD

15 cm / Plumage brun uniforme sur le dos, un peu plus clair sur le ventre / Tache blanche sur les rectrices

Milieux variés toujours en présence de reliefs / Zone rupestre / Du littoral jusqu'à 2 800 m

Insectes et arachnides

Eurasiatique, migratrice transaharienne

Barrage et crues / Pesticides / Activités sportives

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Huppe fasciée

Petugo capeludo

Upupa epops | **Famille :** Upupidés
Ordre : Coraciiformes

Crédit photo ©A. AUDEVARD

26-32 cm, envergure 42-46 / Plumage sable et noir rayé de bandes blanches / Huppe érectile / Long bec arqué

Boisement lâche / Zone de couverture végétale basse pour s'alimenter

Arthropodes / Insectes souterrains

Paléarctique, afro-tropicale et orientale, migratrice transsaharienne

Intensification agricole / Pesticides / Fermeture des milieux / Destruction des haies

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Merle à plastron

Tourdre coularet

Turdus torquatus | **Famille :** Turdidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©L ROUSCHMEYER.

24-27 cm / Large plastron blanc et bec jaune (mâle) / Plumage beige et marron clair et bec sombre (femelle)

Pré-bois composé de forêts de résineux entrecoupées de clairières herbacées

Insectes, vers, lézards, baies et olives

Europe de l'Ouest, migratrice

Forte fréquentation touristique / Exploitation forestière / Changement climatique

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Monticole bleu

Merle rouquié soulitàri

Monticola solitarius | **Famille :** Turdidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©A. AUDEVARD

21-23 cm, envergure 27-32 / Plumage nuptial bleu ardoisé (mâle) / Teinte brune à reflets bleutés (femelle)

Milieu rupestre de basse et moyenne altitudes

Invertébrés en été / Occasionnellement divers graines et fruits

Paléarctique sud, afro-tropicale nord et territoire Indomalais, sédentaire et nicheuse

Fermeture des milieux / Activités sportives / Dérangement / Restauration du bâti / Pesticides

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Œdicnème criard

Bèl uei de Crau

Burhinus oedicnemus | **Famille :** Burhinidés
Ordre : Charadriiformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

44 cm, envergure 77-85 / Plumage brun strié / Grands yeux jaunes / Longues pattes jaunes

Milieu sec / Zone de végétation rase et clairsemée d'aspect steppique

Invertébrés / Occasionnellement petits oiseaux et micromammifères

Europe du Sud, migratrice

Intensification agricole / Pesticides / Diminution de l'élevage ovin / Dérangement / Urbanisation

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Migration : pré- et postnuptiale
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Outarde canepetière

Canepetiero grèfo

Tetrax tetrax | **Famille :** Otididés
Ordre : Gruiformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

43 cm, envergure 105-115 / Cou noir rayé d'une bande blanche en forme de «V» (mâle en plumage nuptial)

Milieu steppique ou pseudo-steppique jusqu'à 1 000 mètres / Plaine cultivée

Insectes et végétaux

Paléarctique, migratrice et sédentaire

Diminution de l'abondance des insectes / Destruction des nichées pendant les fauches / Intensification agricole / Urbanisation

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

VU
EN
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : -
CW : An2
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Pic noir

Picatas negre

Dryocopus martius | **Famille :** Picidés
Ordre : Piciformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

43 cm, envergure 70 / Plumage noir à calotte rouge chez l'adulte / Iris et bec de couleur blanchâtre

Grand massif boisé (chênaies, hêtraies, diverses forêts mixtes, *etc.*)

Fourmis et insectes xylophages / Occasionnellement petits mollusques, arthropodes et végétaux

Paléarctique, migrateur partiel (altitudinale), au comportement erratique

Fragmentation de l'habitat / Plantation de résineux / Exploitation forestière / Dérangement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Pie-grièche à tête rousse

Darnagas rous

Lanius senator | **Famille :** Laniidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo © A. AUDEVARD

19 cm, envergure 30 / Calotte rousse qui descend sur la nuque / Manteau noir / Ventre et croupion blancs

Milieu ouvert à semi-ouvert ensoleillé

Insectivore / Occasionnellement micromammifères

Méditerranéenne, présente de manière sporadique et irrégulière sur le plateau d'Albion

Conditions atmosphériques / Mauvais temps / Fermeture des milieux / Vermifuges

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

NT
VU
CR

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Pie-grièche écorcheur

Darnagas terren

Lanius collurio | **Famille :** Laniidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

17 cm, envergure 24-27 / Calotte et croupion gris cendré / Manteau brun-roux / Masque noir chez le mâle

Milieu ouvert ponctué de buissons et d'arbres isolés

Insectes /
Espèce opportuniste et généraliste

Paléarctique occidental, migratrice

Changement climatique / Modification des pratiques agricoles / Disparition des haies / Pesticides et vermifuges / Diminution de l'élevage bovin et ovin

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Ponte et incubation, élevage des jeunes
Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

LC
NT
VU

STATUTS DE CONSERVATION

DO : An1
CBe : An2
CBo : -

CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF / PNA

STATUTS DE PROTECTION

CARTE DE RÉPARTITION



Pie-grièche méridionale

Darnagas esparvié

Lanius meridionalis | **Famille :** Laniidés
Ordre : Passériformes



Crédit photo : ©A. CHATEIGNIER CC BY-NC-ND 2.0

25 cm / Bec crochu / Masque noir sur les yeux / Sourcil blanc net

Formation arbustive semi-ouverte / Prairie / Friche / Garrigue / Zone semi-steppique

Invertébrés /
Occasionnellement vertébrés

Midi de la France et péninsule Ibérique, principalement sédentaire

Intensification ou déprise agricole / Fermeture des milieux / Uniformisation des paysages agricoles / Pesticides / Dérangement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
Ponte et incubation, élevage des jeunes
Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

VU
EN
EN

STATUTS DE CONSERVATION

DO : -
CBe : An2
CBo : -

CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / DTVB / PNA

STATUTS DE PROTECTION

CARTE DE RÉPARTITION



Rollier d'Europe

Agasso marino d'Éuroupo

Coracias garrulus | **Famille :** Coraciidés
Ordre : Coraciiformes

Crédit photo : ©J. SHAH CC BY-SA 2.0

31 cm, envergure 66-73 / Coloration bleu turquoise sous le corps et sur la tête / Manteau brun-roux

Milieu non homogène et ensoleillé / Secteur ouvert avec des postes d'affût

Insectes, arthropodes, amphibiens et micromammifères

Eurasiatique, afro-tropicale sud et orientale, migratrice et nicheuse

Intensification ou déprise agricole / Uniformisation des milieux / Pesticides / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Traquet motteux

Rouquieròu dóu cuou blanc

Oenanthe oenanthe | **Famille :** Turdidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©A. AUDEVARD

16 cm, envergure 26-32 / Manteau gris / Bandeau noir sur la tête / Calotte grise et sourcil blanc (mâle)

Milieu ouvert à végétation rase et éparse

Insectes / Occasionnellement quelques lombrics et baies

Eurasiatique, Amérique du Nord et Afrique tropicale migratrice et nicheuse

Urbanisation / Fermeture et fragmentation des milieux / Dérangement / Pesticides

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

- Chant territorial, parade, cantonnement et accouplement
- Ponte et incubation, élevage des jeunes
- Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
NT

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Vautour percnoptère

Capoun fèr blanc

Neophron percnopterus | **Famille :** Accipitridés
Ordre : Accipitriformes

Crédit photo ©M. STEENHAUT

70 cm, envergure de 140-175 / Plumage noir et blanc / Face dénudée, jaune-orangée / Bec fin noirâtre

Milieu rupestre pour la nidification / Zone ouverte pour terrain de chasse

Charognard : restes de viande, lambeaux de peau ou de viscères

Paléarctique occidental, afro-tropicale nord, migratrice subsaharienne et nicheuse

Abandon des activités pastorales / Mutation des sols / Poisons et vermifuges / Urbanisation / Activités sportives

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage
Ponte et incubation, élevage des jeunes

STATUTS DE CONSERVATION

VU
EN
CR

STATUTS DE PROTECTION

DO : An1
CBe : An3
CBo : An1
CW : An2
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Venturon montagnard

Cardelino venturoun

Carduelis citrinella | **Famille :** Fringillidés
Ordre : Passériformes

Crédit photo ©JA. AUDEVARD

12 cm, envergure 22 / Plumage jaune-verdâtre / Court sur patte / La femelle est plus sombre

Pré-bois où dominent les résineux de l'étage montagnard à l'étage subalpin

Végétaux / Graines

Européenne, migrateur partiel (altitudinale), au comportement erratique

Fermeture des milieux / Modification des pratiques agricoles et sylvicoles / Exploitation forestière / Changement climatique

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Émancipation des jeunes, dispersion, migration et/ou hivernage
Ponte et incubation, élevage des jeunes

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
LC

STATUTS DE PROTECTION

DO : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



LES MAMMIFÈRES

Crédit photo ©C. LEGG CC BY 2.0

Barbastelle d'Europe

Aurelhasso di péu long

Barbastella barbastellus | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo © R. SANE

24-29 cm / Mèches claires sur le dos, sombres sur le ventre / Face noire / Oreilles se rejoignent sur le front

Gîtes d'été : cavités arboricoles, bardages en bois, fissures de poutres / Gîtes d'hiver souterrains

Papillons tympanés

Européenne, connue seulement en estivage

Entretien ou restauration du bâti / Rajeunissement des peuplements / Déboisement / Défrichement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction
Hibernation
Transit
Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

VU
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional très fort / DZNIEFF / PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Blaireau européen

Tais rabas

Meles meles | **Famille :** Mustélidés
Ordre : Carnivores

Crédit photo ©C. LEGG CC BY 2.0

90 cm avec la queue / Court sur pattes / Pelage gris / Masque noir et blanc / Grosses griffes

Forêt / Bocage / Prairie

Omnivore / Varie en fonction des saisons

Européenne, sédentaire

Modification du paysage et des pratiques agricoles / Trafic routier / Pollution

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits
Diapause embryonnaire

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Espèce chassable
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Campagnol amphibie

Gàrri de vigno aquati

Arvicola sapidus | **Famille :** Cricétidés
Ordre : Rongeurs

Crédit photo ©P. RIGAUX CC BY-NC-SA 2.0

28-35 cm avec la queue / Pelage brun / Queue longue et circulaire / Petites oreilles / Cou peu visible

Milieu aquatique divers / Berge végétalisée

Joncs, graminées, roseaux / Occasionnellement petits poissons, amphibiens

Péninsule Ibérique, localement répartie, sédentaire

Dégradation des zones humides / Pollution / Poison / Concurrence avec le Rat musqué

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction

Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

VU

NT

-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -

CW : -
PN : Oui
ASR : PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Castor d'Eurasie

Vibre rousigaire

Castor fiber | **Famille :** Castoridés
Ordre : Rongeurs

Crédit photo ©D. DUNNOCK CC BY-NC 2.0

80-120 cm / Pelage brun-roux / Petites oreilles / Grandes incisives orangées / Queue aplatie

Cours d'eau de plaine et moyenne montagne / Ripisylve dense

Écorces / Plantes aquatiques / Tubercules

Européenne, sédentaire

Fragmentation des habitats / Canalisation des berges

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction

Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

LC

LC

-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An3
CBo : -

CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / DTVB / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Cerf élaphe

Cèrvi bramaire

Cervus elaphus | **Famille :** Cervidés
Ordre : Artiodactyles

Crédit photo ©C. LEGG CC BY 2.0

120 cm environ au garrot / Pelage brun-roux à gris / Museau allongé / Bois chez les mâles

Plaine et clairière / Massif forestier dense

Écorces / Feuilles mortes / Bourgeons / Jeunes pousses

Paléarctique, sédentaire

Fragmentation des habitats / Trafic routier / Fermeture des milieux / Pression de chasse

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Espèce chassable
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Chamois

Rupicabro chamous

Rupicapra rupicapra | **Famille :** Bovidés
Ordre : Artiodactyles

Crédit photo ©J.C. ARNOUX

90-130 cm de long / Pattes fines / Sabots noirs / Pelage brun-roux / Poitrail, croupe, joues et nez blancs

Haute montagne / Zone ombragée / Pelouse / Boisement

Plantes herbacées / Jeunes pousses / Bourgeons / Écorces

Eurasiatique, sédentaire

Pastoralisme / Exploitation forestière / Chasse et braconnage / Dérangement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An5
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Espèce chassable
ASR : DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Chevreuil

Cabròu japaire

Capreolus capreolus | **Famille :** Cervidés
Ordre : Artiodactyles

Crédit photo ©C. LEGG CC BY 2.0

60-80 cm au garrot / Pelage brun-rouxà brun-gris / Museau allongé / Bois chez les mâles

Milieu forestier / Milieu intermédiaire

Rameaux et feuilles de végétaux ligneux et semi-ligneux / Plantes herbacées / Céréales

Eurasiatique, sédentaire

Perte diversité génétique / Fragmentation des territoires / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits
Diapause embryonnaire

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Espèce chassable
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Genette commune

Janeto chainet

Genetta genetta | **Famille :** Viverridés
Ordre : Carnivores

Crédit photo ©A. CAMPILLO CASTEJON CC BY-NC-ND 2.0

80-100 cm / Corps élancé gris châtain / 3-4 rangées de tâches sombres / Grandes oreilles

Milieu fermé / Zone calme / Végétation abondante

Petits rongeurs / Lapins / Reptiles / Amphibiens / Arthropodes / Charognes

Afrique du Nord, introduite, sédentaire

Fragmentation des habitats / Exploitation forestière / Trafic routier / Poison / Chien domestique

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période principale de reproduction
Naissance possible des petits

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An5
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Hérisson d'Europe

Eiris gris

Erinaceus europaeus | **Famille :** Erinacéidés
Ordre : Erinacéomorphes

Crédit photo ©T. LAAKSO CC BY 2.0

30 cm de long / 5 000-7 000 piquants blancs et noirs sur la face dorsale / Forme ronde et museau pointu

Milieux divers / Ville et village

Omnivore / Insectes et autres invertébrés

Europe de l'Ouest et du Nord, sédentaire

Trafic routier / Fragmentation des habitats / Destruction des haies / Cloisonnement des jardins / Pesticides / Animaux domestiques

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction

Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Lapin de garenne

Lapin de garrigo

Oryctolagus cuniculus | **Famille :** Léporidés
Ordre : Lagomorphes

Crédit photo ©H. QUATRE CC BY-NC-ND 2.0

30-50 cm / Pelage brun-gris / Longues oreilles / Queue et poitrail blanc dessous / Yeux sombres

Milieux divers / Prairie / Garrigue / Lande

Végétaux / Écorces / Bourgeons / Excréments

Paléarctique occidentale, sédentaire

Chasse / Fragmentation et fermeture des milieux / Isolement des populations / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période principale de reproduction

Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

NT
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : Espèce chassable
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Loup gris

Loup gris

Canis lupus | **Famille :** Canidés
Ordre : Carnivores

Crédit photo © L. de CASTRO CC BY 2.0

60-70 cm au garrot / Pelage beige-gris à roux / Museau allongé et pointu / Grandes oreilles arrondies

Milieu montagnard / Forêt de feuillus

Carnivore / Ongulés / Moyens mammifères (blaireaux, lapins...) / Espèces domestiquées

Européenne, sédentaire

Chasse et braconnage / Hybridation avec chien domestique / Transmission de maladies

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

LC
VU
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : -
CW : An2
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Minioptère de Schreibers

Chiriscaudo di long det

Miniopterus schreibersii | **Famille :** Minioptéridés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo © J.M. BOMPAR

30-34 cm / Pelage gris brun sur le dos, plus clair sur le ventre / Front très nettement bombé

Cavernicole stricte / Grottes, carrières et mines

Lépidoptères (jusqu'à 95%) / Névroptères et Diptères

Mondiale, connue en estivage et en transit

Tourisme souterrain et pratiques spéléologiques / Urbanisation / Éoliennes

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Colonie de reproduction
Hibernation
Transit
Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional très fort / DZNIEFF / DTVB / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Molosse de Cestoni

Rato chinas dis alo longo

Tadarida teniotis | **Famille :** Molossidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo © R. SANE

40-45 cm / Pelage dorsal court grisonnant, ventre légèrement plus clair / Gueule de dogue

Falaises / Ponctuellement en bâti

Lépidoptères hétérocères (60 à 90 %) / Diptères, Coléoptères et Hyménoptères

Méditerranéenne jusqu'en Asie, connue en estivage et en transit

Purges de falaises / Grillages de sécurisation / Activités sportives / Rénovation de façade / Éoliennes

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction | Hibernation
Transit | Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional fort / RZNIEFF / PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Mouflon

Moufloun recàpi

Ovis gmelini musimon | **Famille :** Bovidés
Ordre : Cétartiodactyles

Crédit photo ©L. de CASTRO CC BY 2.0

120-140 cm / Pelage brun foncé à beige / Longues cornes en spirale chez le mâle / Museau et pattes blanches

Milieu ouvert de moyenne montagne / Zone boisée en hiver

Plantes herbacées / Feuilles d'arbustes / Bourgeons / Fruits / Racines

Endémique de Corse, introduite, sédentaire

Transmission de maladies / Conditions climatiques / Fragmentation des habitats / Hybridation avec mouton domestique

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

-
-
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : -
CBo : An2
CW : -
PN : Oui / Espèce chassable
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Murin à oreilles échancrées

Rato penado di pelage lanous

Myotis emarginatus | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo © B. MORAZE

22-24,5 cm / Pelage d'apparence laineuse, roux sur le dos, plus clair sur le ventre

Gîtes d'été en bâtiments / Gîtes d'hiver souterrains

Arachnides et Diptères / Névroptères et Lépidoptères

Paléarctique occidental, connue en estivage et en transit

Entretien et restauration de bâti / Éoliennes / Trafic routier / Pesticides / Fermeture des milieux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction | Hibernation
Transit | Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional fort / DZNIEFF / PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Murin de Daubenton

Rato penado di pichótis auriho

Myotis daubentonii | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo © B. MORAZE

24-27,5 cm / Pelage marron sur le dos, blanc cassé à blanc grisâtre sur le ventre

Gîtes d'été : cavités arboricoles, bâtiments et ouvrages d'art / Gîtes d'hiver souterrains

Chironomes et Nématocères / Trichoptères, Ephéméroptères, petits poissons

Eurasiatique, connue en estivage et en transit

Pollution et assecs des cours d'eau / Entretien et rénovation de ponts / Exploitation forestière

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction | Hibernation
Transit | Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional faible

CARTE DE RÉPARTITION



Noctule de Leisler

Rato vourouiro di bras pelous

Nyctalus leisleri | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo ©J.M. BOMPAR

26-34 cm / Pelage brun sur le dos, clair sur le ventre / Oreilles courtes et larges à sommet rond / Tragus court

Arboricole / Ponctuellement en bâti

Lépidoptères (jusqu'à 95%) / Névroptères et Diptères

Paléarctique occidental, connue en estivage et en transit

Exploitation forestière / Pesticides et vermifuges / Éoliennes



STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : An2
PN : Oui
ASR : Enjeu régional modéré / RZNIEFF / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Oreillard gris

Aurihasso gris

Plecotus austriacus | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo ©J.M. BOMPAR

24-30 cm / Pelage dorsal long et gris cendré, clair sur le ventre / Grandes oreilles / Tragus en forme d'épée

Gîtes d'été en bâtiments / Gîtes d'hiver souterrains

Lépidoptères hétérocères (jusqu'à 100%) / Diptères, Coléoptères et Orthoptères

Europe de l'Ouest, connue en estivage

Disparition des haies / Intensification agricole / Réaménagement des combles / Traitement des charpentes / Trafic routier



STATUTS DE CONSERVATION

NT
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional faible

CARTE DE RÉPARTITION



Petit murin

Rato penado dóu vèntre blanc

Myotis blythii | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo ©B. MORAZE

35-40 cm / Pelage gris-brun à brun roux sur le dos, ventre presque blanc

Gîtes d'été souterrains et en bâtiments / Gîtes d'hiver souterrains

Orthoptères

Méridionale, connue en estivage et en hivernage

Réaménagement des combles / Tourisme souterrain et pratiques spéléologiques / Fermeture des milieux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction | Hibernation
Transit | Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

NT
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional très fort / DZNIEFF / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Petit rhinolophe

Rinoulofe di pichot

Rhinolophus hipposideros | **Famille :** Rhinolophidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo ©B. MORAZE

19-25 cm / Pelage brun clair sur le dos et grisâtre sur le ventre

Gîtes d'été en bâtiment / Gîtes d'hiver souterrains

Très diversifié / Insectes de petite et moyenne taille

Septentrionale, européenne, connue en estivage, hivernage et transit

Entretien et restauration du bâti / Pollution lumineuse / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction | Hibernation
Transit | Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

NE
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional fort / RZNIEFF / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Pipistrelle commune

Pipistrello di pichot

Pipistrellus pipistrellus | **Famille :** Vespertilionidés
Ordre : Chiroptères

Crédit photo © J.M. BOMPAR

18-24 cm / Pelage dorsal brun sombre à brun roux, ventre plus clair / Face brun noir

Gîtes d'été en bâtiments /
Gîtes d'hiver souterrains et en bâti

Très opportuniste / Diptères

Eurasiatique, connue en estivage et en transit

Éoliennes / Trafic routier / Entretien et restauration du bâti

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Colonie de reproduction
Hibernation
Transit
Swarming

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : An2
CW : -
PN : Oui
ASR : Enjeu régional faible / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Renard roux

Reinard rous

Vulpes vulpes | **Famille :** Canidés
Ordre : Carnivores

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-SA 2.0

90 cm / Pelage roux / Queue touffue de 40-60 cm / Oreilles triangulaires / Pupilles verticales

Milieu semi-ouvert /
Milieux divers

Petits mammifères / Oiseaux / Insectes /
Fruits et baies

Mondiale, sédentaire

Transmission de maladies / Trafic routier / Chasse

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : Espèce chassable
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



L'ENTOMOFAUNE

Crédit photo ©C. ALONSO

Agrion de Mercure

Damisello de Mercùri

Coenagrion mercuriale | **Famille :** Coenagrionidés
Ordre : Odonates

Crédit photo ©C. ALONSO

18-27 mm / Dessin sur le deuxième segment de l'abdomen : « casque de viking » ou « tête de taureau »

Milieu lotique permanent / Eau claire et bien oxygénée

Petits insectes

Ouest de l'Europe et Afrique du Nord, localement commune jusqu'à 700 m

Changements environnementaux / Curage des fossés / Entretien des berges végétalisées / Pollution

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
				Reproduction et pontes							
				Adulte			État larvaire				

STATUTS DE CONSERVATION

NT
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2
CBe : An2
CBo : -
CW : -

PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF / PNA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Alexanor

Macaoun dóu grand juvert

Papilio alexanor | **Famille :** Papilionidés
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©F GASNIER

31-35 mm / Ailes antérieures jaunes rayées de 4 bandes noires / Ailes postérieures ornées de bleu et orange / 2 queues noires

Milieu pierreux calcaire : éboulis, lit de rivière asséchée / Sur *Ptychotis saxifraga* et *Opopanax chironium*

Chenille : apiacées / Adulte : nectar de fleurs mellifères, notamment Centranthes et Chardons

Eurasiatique, en France en Provence et dans les Alpes du sud

Diminution des plantes-hôtes / Fermeture des milieux / Collectionneurs

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
				Adulte			État larvaire (chenilles)				
				Hibernation (chrysalide)							

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -

CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / PNA & PRA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Apollon

Apouloun dóu rasin

Parnassius apollo | **Famille :** Papilionidés
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

75 mm / Bout des ailes relativement transparent / 2 ocelles rouges sur les ailes antérieures

Pelouses sèches et rocheuses / Sur *Sedum album* principalement, autres Orpins et Joubardes

Chenille : crassulacées / Adulte : nectar de fleurs mellifères

Eurasiatique, entre 500 et 2 500 m

Fermeture des milieux / Extension des plantations forestières / Trafic routier / Changement climatique

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Adulte État larvaire (chenilles)

STATUTS DE CONSERVATION

NT
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -
CW : An2
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF / PNA & PRA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Azuré de la Croisette

Bluiejant di fournigo

Phengaris alcon | **Famille :** Lycaenidés
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©J.P. MOUSSUS

Brun noir teinté de bleu / Petites taches noires sur les ailes antérieures / Bleu clair à la base des ailes postérieures

Prairie mésophile, pelouse sèche / Sur *Gentiana lutea, G. germanica* et *G. cruciata* / Près d'une fourmilière de *Myrmica*

Chenille : boutons floraux de la plante-hôte et larves de la fourmi-hôte / Adulte : nectar de fleurs pourpres, bleues et roses

Eurasiatique, jusqu'à 2 000 m

Fermeture des milieux / Embroussaillement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Adulte État larvaire (chenilles)

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



Azuré du Serpolet

Bluiejant di taco negro

Phengaris arion | **Famille :** Lycaenidés
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

30-34 mm / Tâches noires allongées sur les ailes antérieures / Points noirs formant une « patte de chien » sous les ailes

Prairie buissonnante, pelouse sèche, friche / Sur Serpolets et Origans / Près d'une fourmilière de *Myrmica sabuleti*

Chenille : boutons floraux de la plante-hôte et larves de la fourmi-hôte / Adulte : fleurs pourpres, bleues et roses

Eurasiatique, jusqu'à 2 000 m

Fermeture des milieux / Diminution des plantes-hôtes / Amendement en nitrates des habitats

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Adulte
État larvaire (chenilles)

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NE
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / PNA & PRA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Carabe dorée du Ventoux

Enflo biòu aureja

Carabus auratus honnoratii | **Famille :** Carabidés
Ordre : Coléoptères

Crédit photo ©M.T. ZIANO

17-30 mm / Dessus vert, noirt ou bleu métallique / Reflets cuivrés / Pattes jaunes

Prairie sèche et humide / Culture céréalière

Mollusques terrestres / Vers et larves

Endémique du sud-est de France métropolitaine, à partir du sud de la Drôme

Fragmentation des habitats / Usage accru de pesticides

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Reproduction et ponte
Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NE
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Damier de la succise

Damié de la mourdudo

Euphydryas aurinia provincialis | **Famille :** Nymphalidés
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

36-40 mm / Couleur fauve orangé et noir sur les ailes / Damiers clairs sur fond orangé dessous

Milieu calcaire chaud, sec et caillouteux / Sur *Cephalaria leucantha*

Chenille : parties de la plante-hôte / Occasionnellement *Centranthus* ssp. Et *Lonicea* ssp.

Dans tout le paléarctique jusqu'à 1 800 m

Fermeture des milieux / Urbanisation / Intensification agricole

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Adulte État larvaire (chenilles)

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NE
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : PNA & PRA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Empuse commune

Empuso capeludo

Empusa pennata | **Famille :** Empusidés
Ordre : Mantodés



Crédit photo ©N. LASSAUGE

50-67 mm / Mâle à antennes pectinées / Femelle légèrement plus grandes

Végétation herbacée et arbustive des milieux chauds

Insectivore / Diptères, orthoptères

Méditerranéenne jusqu'à 1 200 m

Fermeture des milieux / Embroussaillement

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Adulte État larvaire

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NE
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : -
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Grand capricorne

Banaru dóu roure

Cerambyx cerdo | **Famille :** Cérambycidés
Ordre : Coléoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

24-62 mm / Thorax effilé à épines latérales / Mâle à antennes très longues dépassant les élytres

Vieille forêt / Chêne âgé et vivant en cours de sénescence / Diverses espèces de feuillus

Larve : bois de l'arbre-hôte /
Adulte : sève et fruits fermentés

Du nord de l'Afrique à l'Europe centrale

Exploitation forestière / Rajeunissement des peuplements / Déboisement

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Reproduction et ponte
Adulte
État larvaire

STATUTS DE CONSERVATION

NT
NE
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Hermite

Parpaioun ermitan

Chazara briseis | **Famille :** Nymphalidés
Ordre : Lépidoptères



Crédit photo ©F. GASNIER

47-58 mm / Ailes antérieures jaune clair, 2 tâches noires / Ailes postérieures tâchées de brun et jaune

Pelouse calcaire sèche / Sur *Sesleria albicans*, *Festuca ovina* et *Brachypodium phoenicoides*, Chardons et Scabieuses

Chenille : Poacées xérophiles (*Sesleria*, *Festuca*, *Brachypodium*, *Stipa*) / Adulte : nectar de fleurs mellifères

Zones tempérées d'Eurasie et d'Afrique du nord jusqu'à 2 000 m

Fermeture des milieux / Fauche précoce / Urbanisation

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Adulte
État larvaire

STATUTS DE CONSERVATION

NT
VU
EN

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : -
ASR : RZNIEFF / PNA & PRA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Lucane cerf-volant

Escarava cèrvi vouladis

Lucanus cervus | **Famille :** Lucanidés
Ordre : Coléoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

20-85 mm / Mâle : largeur de la tête > largeur du corps ; très grandes mandibules / L'inverse pour la femelle

Vieille forêt de feuillu / Arbre en cours de sénéscence / Sur chênes, autres feuillus, très rarement conifères

Larve : bois mort et système racinaire de l'arbre-hôte / Adulte : coulées de sève

Européenne, jusqu'au Proche-Orient

Entretien des forêts / Fragmentation des milieux / Dégradation des continuités écologiques / Changement climatique



STATUTS DE CONSERVATION

NT
NE
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : -
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Magicienne dentelée

Masco dentelado

Saga pedo | **Famille :** Tettigonioidés
Ordre : Orthoptères



Crédit photo ©C. ALONSO

Envergure jusqu'à 110 mm avec l'ovipositeur / Couleur verte ou marron clair / Ligne clair sur les flancs

Milieu méditerranéen, chaud et ouvert / Maquis, garrigue, pelouse mésophile

Autres insectes / Orthoptères

Typiquement méditerranéenne

Fermeture des milieux / Trafic routier / Faible taux de reproduction et dissémination



STATUTS DE CONSERVATION

LC
NE
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Miramelle du Ventoux

Miramello aupenco

Podisma amedegnatoae | **Famille :** Acrididés
Ordre : Orthoptères

Crédit photo ©M.T. ZIANO

20-35 mm / Élytres longs / Mâle : beaucoup plus petit que la femelle / Femelle : points noirs sur le dos

Milieu sec et ensoleillé / Espace rupestre, caillouteux et pentus / Végétation rase ou rare

Herbivore /
Jeunes herbacées, graminées, légumineuses

Endémique de Vaucluse, Drôme et Hautes-Alpes entre 600 et 2 000 m

Fermeture des milieux / Fragmentation des habitats

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Reproduction et ponte | Adulte

STATUTS DE CONSERVATION

NT
NE
NT

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -

CW : -
PN : -
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Proserpine

Diano de la gouderlo

Zerynthia rumina | **Famille :** Papilionidés
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

20-30 mm / Couleur jaune clair / Nombreuses tâches rouges sur les ailes antérieures

Milieu ouvert à sol nu et rocailleux /
Sur *Aristolochia pistolochia*

Chenille : fleurs de la plante-hôte /
Adulte : peu floricoles

Péninsule ibérique, sud de la France et Ligurie italienne jusqu'à 1 300 m

Urbanisation / Fermeture des milieux

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Adulte | État larvaire

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : -

CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF / PNA & PRA / SCAP

CARTE DE RÉPARTITION



Rosalie des Alpes

Rousalìo aupenco

Rosalia alpina | **Famille :** Cérambycidés
Ordre : Coléoptères

Crédit photo ©JC. ALONSO

15-40 mm / Corps bleuté à tâches noires / Touffes de soies noires sur les antennes

Hêtraie et hêtraie-sapinière de montagne / Ripisylve ou allée arborée / Sur hêtres, autres feuillus, rarement chênes

Larve : bois mort et système racinaire de l'arbre-hôte / Adulte : coulées de sève, fruits fermentés ou nectar d'ombellifères

Européenne

Collectionneurs / Entretien des forêts / Stockage du bois d'œuvre

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Reproduction et ponte | Adulte

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NE
NE

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An4 **CW :** -
CBe : An2 **PN :** Oui
CBo : - **ASR :** RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Zygène cendrée

Zygèno de l'esparset

Zygaena rhadamanthus | **Famille :** Zygaenidé
Ordre : Lépidoptères

Crédit photo ©C. ALONSO

Couleur grise des ailes antérieures / Grandes antennes noires / 6 tâches rouges, certaines bordées de noir

Milieu ouvert calcaire, sec et chaud / Garrigue, pelouse sèche / Sur *Lotus dorycnium*

Chenille : feuilles de la plante-hôte / Adulte : Fabacées de couleurs rose, rouge et jaune

Ouest méditerranéen jusqu'à 1 300 m

Fermeture des milieux / Urbanisation

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Adulte

STATUTS DE CONSERVATION

NE
NE
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : - **CW :** -
CBe : - **PN :** Oui
CBo : - **ASR :** DZNIEFF / PNA & PRA

CARTE DE RÉPARTITION



LES AMPHIBIENS

Crédit photo © C. ALONSO

Alyte accoucheur

Alite acouchaire

Alytes obstetricans | **Famille :** Discoglossidés
Ordre : Anoures

Crédit photo ©A. SALESSE CC BY-NC 2.0

5 cm max / Trapu à tête aplatie / Peau verruqueuse grisâtre / Pupille verticale en losange

Ubiquiste /
Tout type de milieu proche des zones humides

Insectes et larves /
Vers et mollusques

Européenne, sédentaire

Fragmentation des habitats / Comblementet ombrage des plans d'eau / Intensification agricole / Pollution / Animaux domestiques

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Migration, reproduction, pontes
État larvaire (têtards)
Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Crapaud calamite

Grapaud calamite di jounc

Epidalea calamita | **Famille :** Bufonidés
Ordre : Anoures

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-SA 2.0

10 cm max / Ligne du dos blanche-jaune / Peau verruqueuse jaunâtre-grise / Pupille noire horizontale

Milieu ouvert / Végétation rase / Pelouse /
Ancienne carrière

Insectes divers / Invertébrés / Arachnides / Crustacés

Européenne, sédentaire

Réaménagement des carrières / Embroussaillement / Urbanisation / Assèchement et pollution des points d'eau / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Migration, reproduction, pontes
État larvaire (têtards)
Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Crapaud épineux

Grapaud di gros

Bufo spinosus | **Famille :** Bufonidés
Ordre : Anoures

Crédit photo © P. AGUILAR

10-15 cm / Peau verruqueuse brune-verte / 2 glandes proéminentes sur la tête / Pupille doré-cuivré horizontale

Ubiquiste / Milieu forestier / Jardins / Étangs / Jusqu'à 2 000 m d'altitude

Invertébrés divers / Vers et limaces / Insectes / Lombrics

Péninsule Ibérique, sédentaire

Destruction et fragmentation des milieux / Trafic routier

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Migration, reproduction, ponte
État larvaire (têtards) Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Pélobate cultripède

Gapaud sabatié mieterran

Pelobates cultripes | **Famille :** Pélobatidés
Ordre : Anoures

Crédit photo © A. ROUX CC BY-NC-SA 2.0

5-10 cm / Massif et trapu / Beige marbré de brun foncé ou vert / Yeux proéminents / Lame cornée sur le pied

Terrain meuble et sablonneux / Dépression humide

Invertébrés / Insectes / Arachnides / Lombrics

Péninsule Ibérique, sédentaire

Urbanisation / Fermeture des milieux / Pollution / Espèces exotiques envahissantes / Trafic routier

JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Migration, reproduction, pontes
État larvaire (têtards) Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

VU
VU
EN

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Pélodyte ponctué

Peloudite pountua

Pelodytes punctatus | **Famille :** Pélobatidés
Ordre : Anoures

Crédit photo ©A. SALESSE CC BY-NC 2.0

3-5 cm / Tête plate et museau arrondi / Peau de couleur claire parsemée de vert-vif / Pupille verticale

Milieu ouvert / Prairie humide / Gravière / Marais

Insectes divers / Arachnides / Vers et limaces

Péninsule Ibérique et méditerranéenne, sédentaire

Destruction et fragmentation des milieux / Pollution / Espèces exotiques envahissantes

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Migration, reproduction, ponte
Etat larvaire (têtards)
Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Rainette méridionale

Reineto mieterrano

Hyla meridionalis | **Famille :** Hylidés
Ordre : Anoures

Crédit photo ©A. SALESSE CC BY-NC 2.0

6 cm / Coloration vert pomme à brune / Bandes sombres de la narine aux pattes avant / Ventouses aux doigts

Milieu à proximité d'eau / Végétation haute

Invertébrés divers / Diptères / Coléoptères / Hyménoptères

Méditerranéenne, sédentaire

Dégradation des zones humides / Pesticides / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Reproduction, pontes
Etat larvaire (têtards)
Activité ralentie

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An4
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Salamandre tachetée

Alabreno picouta

Salamandra salamandra | **Famille :** Salamandridés
Ordre : Urodèles



Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-SA 2.0

15 cm / Noire tachée de jaune / Queue longue / Museau arrondi et court / Yeux noirs

Zone forestière / Fossé / Ornière / Flaques

Petits invertébrés / Larves / Têtards / Lombrics

Europe moyenne et méditerranéenne, sédentaire

Dégradation des zones humides / Fragmentation des habitats / Assèchement et pollution des points d'eau / Trafic routier / Animaux domestiques

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Migration, reproduction, mise-bas
Etat larvaire | Hivernage

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Triton palmé

Gafoui tela

Lissotriton helveticus | **Famille :** Salamandridés
Ordre : Urodèles

Crédit photo ©G. SAN MARTIN CC BY-SA 2.0

5-9 cm / Dimorphisme sexuel fort / Ventre jaune orangé / Pattes postérieures à palmures noires

Point d'eau stagnante / Étangs / Mares / Ornières

Crustacés / Larves et œufs d'insectes

Europe occidentale, sédentaire

Pas de menace particulière sur les populations du Ventoux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Reproduction, pontes
Etat larvaire | Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



LES REPTILES

Crédit photo ©A. SALESSE CC BY-NC 2.0

Couleuvre de Montpellier

Coulobro di gros

Malpolon monspessulanus | **Famille :** Colubridés
Ordre : Squamates

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-SA 2.0

Jusqu'à 2 m / Coloration verte à marron / Tête ovale / Arcade prononcée / Pupille ronde

Ubiquiste / Terrain sec et rocailleux / Garrigue / Zone cultivée

Petits reptiles / Petits mammifères / Oiseaux / Insectes

Méditerranéenne et péninsule arabique, sédentaire

Dégradation du milieu / Fermeture des milieux / Urbanisation / Animaux domestiques / Destruction volontaire / Trafic routier

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Pontes et éclosions | Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Couleuvre vipérine

Serp-d'aigo viperino

Natrix maura | **Famille :** Natricidés
Ordre : Squamates

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-SA 2.0

50-70 cm / Coloration très variable / Motifs en zigzag sur le dos / Pupille ronde

Zone humide diverse (ruisseaux, lacs, rivières, fossés...) / Berge ensoleillée

Espèces aquatiques (poissons, insectes, amphibiens...)

Européenne et méridionale, sédentaire liée aux cours d'eau

Dégradation des zones humides / Pollution / Travaux d'aménagement des berges / Anthropisation / Destruction volontaire

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Pontes et éclosion | Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
LC

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Lézard ocellé

Rassado di taco-bluio

Timon lepidus | **Famille :** Lacertidés
Ordre : Squamates

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-ND 2.0

40-60 cm / Ecailles vertes à jaunes / Ocelles bleues détourées de noir / Face ventrale plus claire

Milieu sec et ensoleillé / Pelouse calcicole, lande ouverte / Maquis, verger

Gros insectes / Lombrics / Fruits / Œufs voire oisillons

Européenne, sédentaire

Fermeture des milieux / Urbanisation / Réduction des populations de Lapin de garenne / Pesticides et vermifuges / Animaux domestiques

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de reproduction
Pontes et éclosions | Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

NT
VU
NT

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An2
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DZNIEFF / DTVB / PNA

CARTE DE RÉPARTITION



Psammodrome d'Edwards

Gramuso de sablo

Psammodromus edwarsianus | **Famille :** Lacertidés
Ordre : Squamates

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-ND 2.0

12-13 cm max / Tête courte et museau pointu / Dos gris-brunâtre avec 6 lignes claires / Ventre clair

Milieu aride et ensoleillé / Végétation basse / Pelouse sèche

Gros insectes / Lombrics / Escargots et limaces

Péninsule Ibérique sédentaire

Intensification agricole / Urbanisation / Feux de forêts

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de reproduction
Pontes et éclosions | Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
NT

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Seps strié

Scinque raia

Chalcides striatus | **Famille :** Scincidés
Ordre : Squamates

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-ND 2.0

40 cm max / Corps serpentiforme grisâtre / Petite tête et museau court / Petites pattes à 3 doigts

Milieu sec et sablonneux / Végétation basse et dense

Petits insectes / Arachnides et myriapodes

Europe occidentale et méditerranéenne, sédentaire

Intensification ou déprise agricole / Fermeture des milieux / Animaux domestiques

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Naissance des petits
Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
NT

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Vipère d'Orsini

Vipero naneto

Vipera ursinii | **Famille :** Vipéridés
Ordre : Squamates

Crédit photo ©A. ROUX CC BY-NC-ND 2.0

40-45 cm / Peau écailleuse et mate / Museau arrondi et tête en triangle / Dessin dorsal en zigzag

Lande et pelouse d'altitude / Ébouli et pente pierreuse

Orthoptères

Eurasiatique très morcelée, en France uniquement à l'extrême sud-est

Urbanisation / Isolement des populations / Fragmentation et fermeture des milieux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction
Pontes et éclosion
Hibernation

STATUTS DE CONSERVATION

VU
VU
EN

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & 4
CBe : An2
CBo : -
CW : An1
PN : Oui
ASR : DZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



LA FAUNE AQUATIQUE

LA FAUNE AQUATIQUE

Crédit photo ©G. SAN MARTIN CC BY-SA 2.0

Anguille européenne

Anguielo de-passo

Anguilla anguilla | **Famille :** Anguillidés
Ordre : Anguilliformes

Crédit photo ©L. MADELON CC BY-NC-SA 2.0

1 m / Mâchoire inférieure > supérieure / Dos brun-vert, ventre jaunâtre ou dos noir, ventre argenté

Eaux douces, lagunes et estuaires / Zones mixtes roches-sédiments / Fonds meubles sablo-vaseux

Carnassière opportuniste / Chasse plutôt la nuit

Paléarctique ouest, Atlantique Nord, sédentaire

Pêche commerciale / Braconnage / Turbines et barrages / Pollution / Changement climatique

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Dévalaison des anguilles matures

Période de remontée principale des civelles

STATUTS DE CONSERVATION

CR
CR
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : -
CBe : -
CBo : An2
CW : An2
PN : -
ASR : DZNIEFF / DTVB

CARTE DE RÉPARTITION



Barbeau fluviatile

Barbèu di quatre-barbihoun

Barbus barbus | **Famille :** Cyprinidés
Ordre : Cypriniformes



Crédit photo ©O. ROQUINARC'H CC BY-NC-SA 2.0

50-100 cm / Museau long / 4 barbillons / Dos uni / Gris à vert ou dorée / Nageoires paires orangées

Cours d'eau larges à courant rapide / Fond de pierres ou de graviers

Invertébrés

Européenne, sédentaire

Pas de menace particulière sur les populations du Ventoux

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An5
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : -
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Barbeau méridional

Barbèu trapot

Barbus meridionalis | **Famille :** Cyprinidés
Ordre : Cypriniformes



Crédit photo ©D. PORACCHIA CC BY-NC-SA 2.0

25 cm / Museau court / 4 barbillons / Dos à marbrures marron / Nageoire anale longue atteignant la caudale

Milieu semi-montagnard / Eaux fraîches / S'accommode de l'assèchement partiel du lit en été

Organismes benthiques : vers, crustacés, mollusques, larves d'insectes

Méditerranéenne, sédentaire

Pollution / Extraction de granulats / Barrages / Captage des petits cours d'eau

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de reproduction

STATUTS DE CONSERVATION

NT
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An5 **CW :** -
CBe : An3 **PN :** Oui
CBo : - **ASR :** DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Blageon

Blajoun gris

Telestes souffia | **Famille :** Cyprinidés
Ordre : Cypriniformes

Crédit photo ©P. BAFFIE CC BY-NC-SA 2.0

12-16 cm / Tête conique, museau arrondi / Bande sombre longitudinale / Ligne latérale rouge-orangé ou noir

Eaux claires et courantes entre 10°C et 20°C / Substrats pierreux ou graveleux

Forte dominance carnivore / Larves d'insectes, diatomées et algues filamenteuses

Méditerranéenne, sédentaire

Colmatage des fonds / Barrages

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de reproduction

STATUTS DE CONSERVATION

LC
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : - **CW :** -
CBe : - **PN :** -
CBo : - **ASR :** DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Chabot commun

Caboto mascariha

Cottus gobio | **Famille :** Cottidés
Ordre : Scorpéniformes

Crédit photo ©Y. LEDORE CC BY-NC-SA 2.0

15 cm max / Tête aplatie à large bouche / Forte épine sur le préopercule / Grandes nageoires pectorales

Eaux fraîches et turbulentes des parties amont et moyennes des cours d'eau / Grands lacs alpins

Tous les organismes vivant sur le fond (oeufs, larves d'insectes, alevins)

Européenne, sédentaire

Pollution / Recalibrages et pompages

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Période de reproduction

STATUTS DE CONSERVATION

VU
LC
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : -
ASR : -

CARTE DE RÉPARTITION



Écrevisse à pattes blanches

Chànvri di pato-blanco

Austropotamobius pallipes | **Famille :** Astacidés
Ordre : Décapodes

Crédit photo © N. LASSAUGE

8-12 cm / Vert-bronze à brun / Face interne des pinces blanche / Pinces rugueuses / Rostre triangulaire

Eaux fraîches bien oxygénées en plaine / Jusqu'à 1 500 m d'altitude

Opportuniste et varié / Petits invertébrés, têtards, petits poissons, cadavres, végétaux...

Europe de l'Ouest, sédentaire

Altération physique des cours d'eau / Pollution / Concurrence avec les espèces américaines

JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

Reproduction et ponte
Éclosion
Croissance
Incubation (6-9 mois)

STATUTS DE CONSERVATION

NE
VU
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2 & An5
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Crédit photo ©J.C. ARNOUX

Toxostome

Flechoun moutounié

Parachondrostoma toxostoma | **Famille :** Cyprinidés
Ordre : Cypriniformes

15-20 cm / Corps fuselé jaunâtre / Tête conique, museau court et pointu / Bouche arquée en fer à cheval

Eaux claires et courantes bien oxygénées / Fonds de galets ou de graviers / Plus rarement rencontré en lac

Essentiellement herbivore / Diatomées, algues filamenteuses...

Nord-est d'Espagne à moitié sud de France, sédentaire

Concurrence et l'hybridation avec le Hotu / Pollution / Travaux d'aménagement / Variation du niveau de l'eau

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Période de reproduction

STATUTS DE CONSERVATION

VU
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2
CBe : An3
CBo : -
CW : -
PN : -
ASR : DTVB / RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Truite commune

Troucho coumuno

Salmo trutta | **Famille :** Salmonidés
Ordre : Salmoniformes

30-90 cm / Corps élancé brun, dos foncé / Points noirs et rouges sur les flancs / Grande nageoire caudale

Eaux froides, claires et courantes / Fond pierreux

Strictement carnivore / Insectes aquatiques et terrestres, crustacés, mollusques, petits batraciens, poissons...

Eurasiatique et afro-tropicale nord, sédentaire

Variabilité génétique / Dégradation et fragmentation des habitats de reproduction / Activités humaines / Changement climatique

JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC

Montaison et reproduction
Dévalaison des juvéniles

STATUTS DE CONSERVATION

LC
NT
-

STATUTS DE PROTECTION

DHFF : An2
CBe : -
CBo : -
CW : -
PN : Oui
ASR : RZNIEFF

CARTE DE RÉPARTITION



Crédit photo ©L. MADELON CC BY-NC-SA 2.0

BIBLIOGRAPHIE

FLORE

BARTHELD, R. (2017). Analyse de l'évolution des milieux ouverts du site Natura 2000 du Mont Ventoux. Étude synchronique des effets du pâturage. SMAEMV. 112p.

BENSETTITI, F. et al. (2002). « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 6 : Espèces végétales. MATE, MAP, MNHN. La Documentation française, Paris. 271p.

CAMBECÈDES, J., LARGIER, G. & LOMBARD, A. (2012). PNA en faveur des plantes messicoles (2012-2017). Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Fédération des CBN. Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. 242p.

CROZE, T. (2013). Sables du Comtat Venaissin : contribution floristique. Bull. Soc. Bot. Vaucluse. 22:12-21p.

DANTON, P. & BAFFRAY, M. (1995). Inventaire des plantes protégées en France. Nathan, Paris. 293p.

GIRERD, B. & HAUREZ, J. (2016). Flore du Ventoux. De 1500 m au sommet. Ed. du Toulourenc, Esprit des Lieux, Brantes. 190p.

HUC, S. (2015). PRA de la flore messicole de Provence-Alpes-Côte d'Azur (2015-2017). Rapport d'étude. Conservatoire botanique national alpin.

MARTIN, R. & LANDRU, G. (2007). Orchidées du Mont Ventoux. Ed. du Toulourenc.199p.

MARTIN-GOUSSET, L. & TERRACOL, J. (2016). Description des habitats et évaluation de leur dynamique au sein de la RBI du Mont Ventoux. ONF, AgroParisTech.

MONTESINOS, B. (2012). Analyse de l'évolution des milieux ouverts du site Natura 2000 du Mont Ventoux. Proposition et application d'un cadre scientifique et technique. SMAEMV. 26p.

OLIVIER, L. et al. (1995). Livre rouge de la flore menacée de France. Tome 1 : Espèces prioritaires. Collection patrimoines naturels.

REDURON, J.P. (2007). Ombellifères de France. Vol. 3. Soc. Bot. du Centre-Ouest.

ROUX, J.P. & TERRACOL, J. (2012). Suivi de la recolonisation des couloirs d'avalanche. Réserve Biologique Intégrale (RBI) du Mont Ventoux. 2e inventaire. ONF.

TERRACOL, J. et al. (2006). Réserve Biologique Intégrale du Mont Ventoux. Rapport de présentation en vue de la création de la Réserve et premier plan de gestion 2007-2021. ONF.

TERRACOL, J. et al. (2008). Inventaire des peuplements de la Réserve Biologique Intégrale du Mont-Ventoux, phase initiale. Rapport scientifique. ONF.

AVIFAUNE

BENTON, T.G. et al. (2002). Linking agricultural practice to insect and bird populations: a historical study over three decades. Journal of Applied Ecology. 39:673-687p.

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004). Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: Birdlife International. 374p.

BLANC, G. & TATIN, D. (2011). Diagnostic sur l'avifaune nicheuse du « val de Nesque ». CEN de Provence-Alpes-Côte d'Azur. 55p.

CEN PACA & ONF. (2015). Amélioration de la connaissance des rapaces nocturnes de la RBI du Mont Ventoux. Réserve Biologique Intégrale du Mont Ventoux. ONF.

CORA Drôme (2003). Oiseaux de la Drôme. Atlas des oiseaux nicheurs de la Drôme. CORA. 147p.

DUBOIS, P.J. et al. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux et Niestlé. 560p.

FLITTI, A. et al. (2009). Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur. LPO PACA, Delachaux et Niestlé. 544p.

HAGEMEIJER, W.J.M. & BLAIR, M.J. (1997). The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T & AD Poyser, London. 903p.

JOHANNOT, F. & WELTZ, M. (2012). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 8 : Oiseaux (Vol 1) : de l'Aigle botté à la Fauvette pitchou. La documentation française, Paris. 382p.

LASCEVE M. et al. (2006). Oiseaux remarquables de Provence. Ecologie, statut et conservation. LPO PACA, CEEP, DIREN PACA, région PACA. Delachaux et Niestlé, Paris. 322p.

OLIOSO, G. (1996). Oiseaux de Vaucluse et de la Drôme provençale. Centre de Recherche sur les Oiseaux de Provence. Conservatoire Étude des Ecosystèmes de Provence & Soc. d'Études Ornithologiques de France. 207p.

ROCAMORA, G. & YEATMAN-BERTHELOT, D. (1999). Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Soc. d'Études Ornithologiques de France, LPO. Paris. 560p.

SALVAN, J. (1983). L'Avifaune du Gard et de Vaucluse. Nîmes. 238p.

SERIOT, J. & ROCAMORA, G. (1992). Les rapaces et le réseau électrique aérien. Rapport EDF, LPO. 48p.

SVENSSON, L. (2009). Le guide ornitho. Les Guides du Naturaliste. Delachaux et Niestlé. 445p.

TARIEL, Y. (1995). Surveillance des aires de rapaces menacés. Rapport annuel 1994. Bulletin Fir. 26:18-27p.

TUCKER, G.M. & EVANS, M. (1997). Habitats for birds in Europe. A Conservation Strategy for the Wider Environment. BirdLife Conservation Series n° 6. BirdLife International, Cambridge. 239–265p.

VANSTEENWEGEN, C. (1998). L'histoire des oiseaux de France, Suisse et Belgique. L'évolution des populations, le statut des espèces. Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris. 336p.

MAMMIFÈRES

ALBALAT, F. & PORTALIER, F. (2013). Réalisation de prospections chiroptérologiques en période d'hibernation dans le périmètre d'extension du site Natura 2000 des Gorges de la Nesque. GCP, SMAEMV. 53p.

ALBALAT, F., SARREY, D. & PORTALIER, F. (2014). Inventaire et cartographie des Chiroptères du site Natura 2000 FR9301580 Mont-Ventoux. GCP, SMAEMV. 144p.

ALLEGRINI, B. & PEYRE, O. (2008). Définition des enjeux biologiques sur le site des Gorges de la Nesque. Inventaires et diagnostics. Naturalia Environnement, SMAEMV. 45p.

ARTHUR, L. & LEMAIRE, M. (2015). Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope). MNHN, Paris. 544p.

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-HILAIRE. (s.d.) Guide du Mont Ventoux. Département de Vaucluse, Tourisme en Vaucluse Provence, Vaucluse en Provence Avignon Luberon Mont-Ventoux. 117p.

BODIN, J. (2011). Les chauves-souris de Midi-Pyrénées : répartition, écologie, conservation. Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, Groupe Chiroptères de Midi-Pyrénées, Toulouse. 256p.

BURTON, M. (1976). Tous les mammifères d'Europe en couleurs. Elsevier. 256p.

DIETZ, C. & KIEFER, A. (2015). Chauves-souris d'Europe : connaître, identifier, protéger. Delachaux et Niestlé, Paris. 399p.

DUPRE, A. et al. (2017). Le grand livre Nature. Artémis. 543p.

DOBRORUKA, L.J. & BERGER, Z. (1987). Guide des mammifères d'Europe. Hatier. 189p.

GATTUS, J.C. & BIACHE, C. (2016). RBI du Mont-Ventoux. Étude des Chiroptères de deux cavités en période automnale. Réseau Mammifères, ONF, Paris. 23p.

GMN & AULAGNIER, S. (2004). Les mammifères sauvages de Normandie : Statut et Répartition. 308p.

GROUPE CHIROPTÈRES de la LPO RHÔNE-ALPES. (2014). Les chauves-souris de Rhône-Alpes. LPO Rhône-Alpes, Lyon. 480p.

HAINARD, R. (1997). Mammifères sauvages d'Europe. Delachaux et Niestlé, 4e édition. 670p.

LPO PACA. (2010). Vaucluse Nature, collectif LPO. Ed. du Toulourenc. 147p.

LPO PACA, GECEM & GCP (2016). Les mammifères de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Biotope, Mèze. 344p.

MAC DONALD, D. & BARRETT, P. (1995). Guide complet des Mammifères de France et d'Europe. Delachaux et Niestlé. 304p.

OPPLIGER, J. (s.d.). Les chauves-souris (Chiroptera, Mammalia) des gisements tardiglaciaires et holocènes du Mont-Ventoux (Vaucluse, France). Muséum d'histoire naturelle de Genève et Université de Genève.

PARC NATIONAL DES ECRINS ET CENTRE DE RECHERCHE ALPIN SUR LES VERTÉBRÉS. (1995). Faune sauvage des Alpes du Haut-Dauphiné. Atlas de Vertébrés. Tome 1 : Poissons, Amphibiens, Reptiles, Mammifères. PNN des Ecrins, Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés, Gap. 303p.

RUYS, T. & BERNARD, Y. (2014). Atlas des mammifères sauvages d'Aquitaine. Tome 4. Les Chiroptères. Cistude Nature & LPO Aquitaine. C. Nature. 256p.

ENTOMOFAUNE

AUDDICE ENVIRONNEMENT. (2017). Étude de l'entomofaune FR9302003 ZSC « Gorges de la Nesque ». Communes de Monieux, Méthamis, Blauvac et Villes-sur-Auzon. 84:70p.

BAUR, B. et al. (2006). Sauterelles, Grillons et Criquets de Suisse. Haupt, Berne. 352p.

BELLMANN, H. & LUQUET, G. (2009). Guide des sauterelles, grillons et criquets d'Europe occidentale. Delachaux et Niestlé, Paris. 383p.

BENCE, S. et al. (2018). Liste rouge des orthoptères de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. CEN de Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 43p.

BENCE, S. & RICHAUD, S. (2019). Atlas des papillons de jour et zygènes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. CEN de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le naturographe, Gap. 544p.

BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. (2004). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7 : Espèces animales. La Documentation française. 353p.

BOUDOT, J.P. et al. (2017). Les libellules de France, Belgique et Luxembourg, 2e édition. Biotope, Mèze, Collection Parthénope. 455p.

BOUGET, C. et al. (2019). Les coléoptères saproxyliques de France : catalogue écologique illustré. Publications sci. du Muséum, MNHN de Paris. 738p.

BRAUD, Y. & COACHE, A. (2013). Les coléoptères d'intérêt communautaire (an. 2 de la directive Habitats) sur le site Natura 2000 « Mont-Ventoux » (FR9301580). Rapport d'étude INSECTA pour le SMAEMV. 45p.

CHINERY, M. (2012). Insectes de France et d'Europe occidentale. Flammarion. 320p.

COULON, J. et al. (2011). Coléoptères Carabidae de France : Compléments aux 2 vol de R. Jeannel. Mise à jour, corrections et répertoire. Faune de France. 352p.

DUPONT, P. (2010). PNA en faveur des Maculinea. OPIE, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 138p.

DUPONT, P. (2010). PNA en faveur des Odonates. OPIE, Soc. Française d'Odonatologie, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer. 170p.

GRAND, D., BOUDOT, J.P. & DOUCET, G. (2014). Cahier d'identification des Libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Collection Cahier d'identification. Biotope, Mèze. 136p.

HOUARD, X. & JAULIN, S. (2018). PNA Papillons de jour (2021-2028). OPIE. 64p.

JEANNEL, R. (1941). Coléoptères carabiques (1ère partie). Collection Faune de France, Paris. 577p.

JUILLERAT, L. & VÖGELI, M. (2004). Gestion des vieux arbres et maintien des Coléoptères saproxyliques en zone urbaine et périurbaine. CSCF, Neuchâtel. 20p.

LAFRANCHIS, T., & JUTZELER, D. (2014). Papillons de France : guide de détermination des papillons diurnes (Rhopalocères, Zygènes et Hétérocères diurnes). Diathéo. 351p.

LAFRANCHIS, T. et al. (2015). La vie des Papillons de France : écologie, biologie et comportement des Rhopalocères de France. Diathéo. 751p.

LE GUELLEC, G. (2008). Insectes de Méditerranée : Arachnides et Myriapodes. Edisud. 207p.

LERAUT, P. (2003). Le guide entomologique. Les guides du Naturaliste, Delachaux et Niestlé, Paris. 527p.

LPO PACA. (2015). Clé de détermination simplifiée des Mantes en Région PACA, V1. 23p.

RICHAUD, S. (2021). Déclinaison régionale du PNA en faveur des papillons de jour. CEN de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sisteron. 139p.

SARDET, E., ROESTI, C. & BRAUD, Y. (2015). Cahier d'identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope. 304p.

VOISIN, J.F. (2003). Atlas des Orthoptères (Insecta : Orthoptera) et des Mantides (Insecte : Mantodea) de France. Patrimoines Naturels. 60:104p.

ZAHRADNIK, J. et al. (1984). A field guide in color to insects. Hatier, Fribourg (Suisse). 318p.

AMPHIBIENS & REPTILE

ACEMAV coll., DUGUET, R. & MELKI, F. (2003). Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, Biotope. 480p.

BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. (2004). Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7 : Espèces animales. La Documentation française. 353p.

CETTIA IDF. (s.d.). Clés de détermination Amphibiens. Cettia Ile-de-France, Base de données naturalistes d'Ile-de-France.

DARMANGEAT, P. & SANTIANI, M. (2008). Amphibiens et reptiles. Artémis, Découverte nature. 90p.

DUPRE, A. et al. (2017). Le grand livre Nature. Artémis. 543p.

LESCURE, J. & DE MASSARY, J.C. (2012). Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze, MNHN, Paris. 272p.

LPO PACA. (2010). Vaucluse Nature, collectif LPO. Ed. du Toulourenc. 147p.

MEYER, C. (2019). Dictionnaire des Sciences Animales. Montpellier, France, Cirad, Ed sc.

MICHEL, V. & MERCKLE, P. (2016). Les amphibiens d'Alsace, Guide de détermination. Conseil Départemental du Haut-Rhin, BUFO. 17p.

PEYRE, O., OLIOSO, G. & JOUBERT, V. (2005). Atlas préliminaire de répartition des reptiles et amphibiens du Vaucluse. Vaucluse Faune. 68-95p.

ROUX, A. et al. (2019). Ocres, Sables, Gypses et Argiles des piémonts du Ventoux. Diagnostic de territoire et proposition de gestion. SMAEMV. 210p.

THIRION, J.M. & AVRARD, P. (2012). Guide des amphibiens et reptiles de France. Belin. 162-163p.

FAUNE AQUATIQUE

CHANGEUX, T. & PONT, D. (1995). Current status of the riverine fishes of the French Mediterranean bassin. Biological Conservation. 72:137-158p.

COROLLA, J.P. et al. (2012). La vie en eau douce. Les carnets du plongeur, Neptune Plongée. 416p.

KEITH, P. et al. (2011). Les poissons d'eau douce de France. Collection Inventaires & biodiversité. MNHN, Biotope, Mèze. 552p.

KOTTELAT, M. (1997). European freshwater fishes. Biologia 52, Suppl. 5:1-271p.

MAITLAND, P. (1995). Freshwater fish of annexes II and IV of the EC habitats directive (92/43/EEC). Rapport final. 179p.

MUUS, B.J. & DAHLSTRÖM, P. (1991). Guide des poissons et de la pêche. Guides des Naturalistes. Delachaux & Niestlé., 228p.

SOUCHON, Y., & TISSOT, L. (2012). Synthesis of thermal tolerances of the common freshwater fish species in large Western Europe rivers. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 405(03).

SPILLMANN, C.J. (1961). Faune de France. Vol 65. Poissons d'eau douce. Paul Lechevalier, Paris. 304p.

TISSOT, L. & SOUCHON, Y. (2011). Synthèse des tolérances thermiques des principales espèces de poissons des rivières et fleuves de plaine de l'ouest européen. Hydroécologie Appliquée. 17:17-76p.

GLOSSAIRE

Mot	Définition
Agrosystème	Ecosystème modifié et contrôlé par l'Homme et dédié à l'exercice de l'agriculture (cultures, élevage, échanges de produits, ...)
Alevin	Poisson juvénile (subadulte éclos)
Anthropisation	Effet de l'action humaine sur les milieux naturels
Apiacées	Famille de plante à fleur ombellifère
Arthropode	Embranchement d'animaux invertébrés
Autochtone	Originaire du millieu où l'espèce vit
Avifaune	Ensemble des oiseaux
Barbillons	Filaments tactiles mous et sensibles placés par paires de chaque côté de la bouche chez certains poissons
Biotope	Aire géographique réduite ayant des conditions climatiques et biologiques définies
Bocage	Champs bordés de haies
Cavernicole	Vivant dans une caverne
Chironomes	Moucheron des marais, dont la larve est nommée "ver de vase"
Chiroptère	Ordre des chauves-souris
Chrysalide	Etat intermédiaire entre la chenille et le papillon chez les lépidoptères
Crassulacées	Famille de plantes herbacées ou sous-ligneuses, à feuilles généralement charnues, sans stipules, simples et entières
Dévalaison	Migration vers l'aval
Diapause embryonnaire	Période d'arrêt du développement de l'embryon
Diatomées	Élément d'une classe d'algues unicellulaires
Diptère	Insecte qui possède deux ailes
Elytre	Aile dure et cornée des coléoptères
Endémique	Espèce exclusivement présente dans une région géographique délimitée
Entomofaune	Ensemble des insectes et des arthropodes d'un milieu
Ephéméroptère	Ordre d'insectes se trouvant dans des zones d'eaux douces, communément appelés "Ephémères"
Floricole	Qui vit sur les fleurs
Garrigue	Formation végétale méditeranéene sur sol calcaire
Gîte	Lieu de refuge
Graminée	Plantes à fleurs discrètes, comprenant les herbes des prairies et les céréales
Herpétofaune	Ensemble des amphibiens et reptiles sur un milieu
Hétèrocère	Ordre d'insectes communément appelés "Papillons de nuit"
Hêtraie	Forêt peuplé majoritairement de hêtres
Hyménoptère	Ordre d'insectes qui possèdent quatre ailes transparentes (ex. guêpe, abeille)
Insecte-hôte	Organisme qui héberge un parasite
Landes	Formation végétale souvent composée d'herbes basses
Légumineuse	Plantes dont le fruit est une gousse (ex. haricot, lentille)
Lépidoptère	Ordre d'insecte dont la forme adulte est communément appelée "Papillon"
Ligneux	Qui est constinué de bois
Liste rouge	Inventaire d'espèces animales et végétales qui évalue leurs statuts de conservation
Maquis	Formation d'arbustes et buissons sur sol siliceux
Marne	Roche sédimentaire, mélange de calcite et d'argile dans des proportions à peu près équivalentes

Mot	Définition
Mellifère	Qui produit un nectar qui peut être transformé en miel
Mésophile	Organisme qui se développe le mieux à des températures modérées variant entre 15 °C et 45 °C
Milieu lotique	Milieu aquatique caractérisé par de forts courrants
Milieu ouvert	Milieu composé d'une végétation basse
Myriapode	Sous embranchement des arthropodes, communément appelés "mille-pattes"
Natura 2000	Réseau européen de sites écologiques protégés
Nématocères	Sous-ordre d'insectes diptères à antennes, comme le moustique.
Névroptères	Ordre d'insectes pourvus de quatres ailes de grande dimension et fortement nervurées
Ombellifère	Fleur portant des ombelles
Organismes benthiques	Macro-invertébrés se nourrissant de sédiments dans un cours d'eau
Orthoptères	Ordre d'insectes broyeurs dont les ailes postérieures se replient, comme le criquet
Pelouse sèche	Formation végétale peu épaisse et peu élevée d'herbacées permanentes
Phénologie	Evènements périodiques propres au développement de l'espèce
Plante annuelle	Plante qui germe, fleurit, produit des graines, puis meurt en l'espace d'une seule année
Plante vivace	Plante qui peut vivre plusieurs années
Plante-hôte	Plante acceuillant des insectes et autres organismes vivant nécessaires à leur cycle de vie
Préopercule	Pièce osseuse permettant l'articulation entre le crâne et l'opercule chez les poissons
Prostré	Qui se developpe très près du sol
Ripisylve	Végétation arborée bordant un cours d'eau
Sénescence	Vieillissement naturel d'un organisme
Swarming	Terme anglais pouvant être traduit par "essaimage", consiste en un regroupement d'individus
Trame bleue	Zone de connexion biologique entre les habitats aquatiques
Trame verte	Zone de connexion biologique entre les habitats terrestres
Transit	Période transitoire de migration
Trichoptères	Ordre d'insectes adaptés à la vie en eau douce dans leur stade larvaire
Ubiquiste	Espèce pouvant s'adapter aux milieux les plus divers

SIGLES

Sigle	Définition
ABC	Atlas de la Biodiversité Communale
An	Annexe
ASR	Autres Statuts Régionaux
Cbe	Convention de Berne
CBNMed	Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles
Cbo	Convention de Bonn
CC	Creative Common
CEN	Conservatoire des Espaces Naturels
CR	Espèce En danger CRitique d'extinction (liste rouge)
CW	Convention de Washington ou CITES
DD	Données insuffisantes
DHFF	Directive européenne Habitats-Faune-Flore
DO	Directive européenne Oiseaux
DTVB	Espèce Déterminante Trame Verte et Bleue
DZNIEFF	Espèce Déterminante Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ECO-MED	Bureau d'études naturalistes "Ecologie et Médiation"
EDF	Electricité De France
EN	Espèce EN danger d'extinction (liste rouge)
GCP	Ggroupe Chiroptère de Provence
IC prio	Espèce d'Intérêt communautaire prioritaire
INPN	Inventaire National du Patrimoine Naturel
LC	Espèce en Préoccupation mineure / Low Caution (liste rouge)
LPO	Ligue pour la Protection des Oiseaux
MEDDE	Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
MNHN	Museum National d'Histoire Naturelle
NA	Non applicable (liste rouge)
NE	Espèce Non Evaluée (liste rouge)
NT	Espèce Quasi menacée / Near Threatened (liste rouge)
OFB	Office Français de la Biodiversité
ONF	Office National des Forêts
OPIE	Office Pour les Insectes et leur Environnement
PACA	Provence-Alpes-Côte d'Azur
PN	Espèce Protégée au niveau National
PN	Parc National
PNA	Plan National d'Action
PNR	Parc Naturel Régional
PNRMV	Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux
PR	Espèce Protégée au niveau Régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
PRA	Plan Régional d'Action
RBI	Réserve Biologique Integrale
RTVB	Espèce Remarquable Trame Verte et Bleue
RZNIEFF	Espèce Remarquable Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
SCAP	Stratégie de Création d'Aires Protégées
SMAEMV	Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont-Ventoux
UICN	Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
VU	Espèce Vulnérable (liste rouge)

Cet Atlas de la Biodiversité Remarquable a été créé dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) afin de fournir une base solide de données sur la biodiversité de la région.
133 pages pour y décrire et présenter 108 espèces considérées remarquables, accompagnées de description, de photographies et de leur emplacement dans le Parc naturel régional du Mont-Ventoux.

Aubignan	Monieux
Aurel	Mormoiron
Le Barroux	Pernes-les-fontaines
Le Beaucet	Puyméras
Bedoin	Saint-Christol d'Albion
Blauvac	Saint-Didier
Brantes	Saint-Hippolyte-le-Graveyron
Crestet	Saint-Léger-du-Ventoux
Carpentras	Saint-Marcellin-lès-Vaison
Caromb	Saint-Pierre-de-Vassols
Crillon-le-Brave	Saint-Romain-en-Viennois
Entrechaux	Saint-Trinit
Faucon	Sault
Flassan	Savoillans
Malaucène	Vaison-la-Romaine
Malemort-du-Comtat	Velleron
Mazan	Venasque
Méthamis	Villes-sur-Auzon
Modène	

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Crédits photos ©PNR Mont-Ventoux - Création graphique Agence Autrement Dit

Parc naturel régional du Mont-Ventoux
Pargue dóu Ventour

unesco
Réserve de biosphère du Mont-Ventoux

Parc naturel régional du Mont-Ventoux
378, avenue Jean Jaurès, 84200 Carpentras
Tél : 04 90 63 22 74 • courriel : contact@parcduventoux.fr
www.parcduventoux.fr

Avec le soutien financier de :

RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

UNION EUROPÉENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

FRANCE RELANCE